

BHVi 2008:4

# BHVi

## ***Råd och information från barnhälsovårdsöverläkaren***

Angående införande av vaccination mot pneumokocker i det allmänna vaccinationsprogrammet

### **Bakgrund**

Allvarliga infektioner med pneumokocker (*Streptococcus pneumoniae*) är sällsynta, men kan medföra död eller svåra komplikationer i efterförloppet. Ungefär 80 barn drabbas varje år i Sverige, och därav avlider 2-4 barn. I Halland har 4 fall upptäckts sedan 2004, och inga dödsfall har förekommit.

Socialstyrelsen beslutade den 13 maj 2008 (SOSFS 2008:7) att från och med den 1 januari 2009 införa vaccination mot pneumokocker i det allmänna vaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 mån ålder.

Vaccinationen har lagts vid dessa åldrar, dels för att vara kompatibel med tidigare vaccinationsprogram, dels för att det är vanligare med pneumokockinfektioner före två års ålder. Det anges i den sammanfattande bedömningen att vaccinationen bör påbörjas tidigt under det första levnadsåret. För barn som inte vaccineras vid angivna åldrar, har Socialstyrelsen utgivit anvisningar om vilka avvikelser som får göras utan särskild läkarordination. Om ambition finns att utöka Socialstyrelsens beslut, är det därför angeläget att de minsta barnen vaccineras i första hand. Följande förslag är baserat på medicinsk prioritering av de minsta barnen och intentionen att förenkla logistiken på barnvårdscentralerna under det första året då ungefär en halv årskull behöver vaccineras utöver ordinarie verksamhet.

### **Utförande**

Vaccination mot pneumokocker påbörjas på barnvårdscentralerna i Halland från och med den 1 januari 2009. Utbildningstillfällen för all personal kommer att genomföras under två halva utbildningsdagar, den 1 och 10 december. Detta innebär att barn födda från och med den 1 oktober 2008 automatiskt kan ingå, och därmed få sina vaccinationer vid ordinarie tidpunkter. För att uppfylla Socialstyrelsens intentioner att skydda de minsta barnen och att påbörja vaccinationen så tidigt som möjligt och samtidigt respektera de gränser som BVC-sköterskan självständigt kan vaccinera inom, kan även barn som blir mellan 3 och 6 månader vid årsskiftet (födda under tredje kvartalet 2008)

vaccineras. Barn födda under 2008, och som påbörjat vaccination mot pneumokocker, erbjuds kostnadsfri vaccination på BVC.

**Sammanfattning:**

- Alla barn som föds från och med 1 oktober 2008 erbjuds kostnadsfri vaccination mot pneumokocker vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Detta sker vid samma kontroller som vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae, dock på olika injektionsställen (se BHVi 2007:6).
- Alla barn som föds mellan den 1 juli och 30 september 2008 erbjuds kostnadsfri vaccination mot pneumokocker vid 3 tillfällen enligt Socialstyrelsens anvisningar om avvikelse från tidpunkter (SOSFS 2008:7). Detta sker lämpligen vid planerad kontroll på barnvårdscentralen, så att första injektionen ges vid 3 - 6 månaders ålder, andra vid 5 - 12 månaders ålder och den tredje vid 12 - 24 månaders ålder, beroende på lokala förhållanden på barnvårdscentralen.
- Barn födda under 2008, och som påbörjat vaccination mot pneumokocker, erbjuds återstående vaccinationer utan kostnad.

Kungsbacka den 14 oktober 2008



barnhälsovårdsöverläkare