

BHVi 2008:2

BHVi

Råd och information från barnhälsovårdsöverläkaren

Angående mässlingsvaccination vid utlandsresa

Bakgrund

Det har konstaterats ett ökat antal fall av mässling i Schweiz, Italien, Storbritannien och Sydtyskland, framför allt på grund av låg vaccinationstäckning, vilket ökar risken att smittas med mässling där. Påtaglig risk för smitta föreligger även i mer fjärran områden i världen med låg vaccinationstäckning, som i Afrika och Asien. Thailand är ett exempel, dit vi ofta reser med barn.

För att förhindra att barn före 18 månaders ålder smittas vid sådana resor, tillåter det nya barnvaccinationsschemat att sköterskor på delegation får ge MPR-vaccin mellan 12 och 18 månaders ålder vid behov. Dessa barn behöver då inte boostervaccineras förrän i skolhälsovården. För yngre barn kan MPR-vaccinet i de flesta fall ges från 9 månaders ålder, förutsatt att barnet vaccinerats även vid 18 månaders ålder. Före 9 månaders ålder kan maternella antikroppar förhindra anslag av vaccinet, och det bör därför endast ges efter bedömning på vaccinationsmottagning. I vissa fall är det möjligt att leta upp MVC-prov och analysera för mässlingsantikroppar.

Med hänsyn till det epidemiologiska läget bör MPR-vaccination av barn mellan 9 och 18 månader rekommenderas inför resa till Schweiz, Sydtyskland, Storbritannien och Italien och mera avlägsna länder med liten eller ingen mässlingsvaccination. Den förälder som vill ha sitt barn vaccinerat i förtid inför en resa bör inte nekas detta, förutsatt att barnet är mer än 9 månader, men det bör rekommenderas aktivt bara inför resa till dessa länder.

Vidare läsning

<http://www.smittskyddsinstitutet.se/presstjanst/pressmeddelanden-och-pressinbjudningar/2008/smittskyddsinstitutet-uppmanar-till-vaccination-mot-massling/>

<http://www.smittskyddsinstitutet.se/vanliga-fragor/allmanna-vaccinationsprogrammet/massling-passjuka-och-roda-hund/>

Sammanfattning

- Barn över 9 månader bör rekommenderas MPR före resa till Schweiz, Italien, Storbritannien och Sydtyskland samt fjärran resmål i Afrika och Asien.
- Barn mellan 12 och 18 månaders ålder vaccineras efter ställningstagande av BVC-sköterska.
- Barn mellan 9 och 12 månader vaccineras efter ordination av BVC-läkare, och skall även revaccineras vid 18 månaders ålder.
- Resevaccinfrågor rörande barn under 9 månaders ålder bör hänvisas till vaccinationsmottagning.

Kungsbacka den 17 mars 2008

Bernt Alm

barnhälsovårdsöverläkare