

BHVi 2007:6

BHVi

Råd och information från barnhälsovårdsöverläkaren

Angående vaccinationsställe för grundvaccination av förskolebarn

Bakgrund

På BVC vaccineras enligt det allmänna och delvis enligt det särskilda vaccinationsprogrammet. Vacciner som inte ingår i dessa program ges på vårdcentral, vaccinations- eller barnmottagning. Ett exempel på ett sådant nytt vaccin är vaccin mot pneumokockinfektioner, Prevenar®. Detta vaccin ges vid samma åldrar som den pentavalenta grundvaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, haemophilus influenzae och polio (Pentavac®, Infanrix-Polio-Hib®), och för riskbarn den hexavalenta inkluderande hepatit B. På de flesta ställen i landet ges grundvaccination på BVC enligt schemat 3 mån - höger lår, 5 mån - vänster lår och 12 mån - höger lår. Detta har sedan några år inte varit fallet överallt i Halland, vilket har gått bra att göra då de flesta förskolebarnen inte vaccinerats annat än på BVC utom i undantagsfall.

I och med att allt fler barn kommer att vaccineras med pneumokockvaccin, uppkommer också ett krav på att veta vilken vaccination som givits, och var den givits. Fullständig kontroll på detta kommer inte att fås förrän det nationella, datoriserade vaccinregistreringsprogrammet SWEVAC integreras med VAS-journalen, vilket kan dröja. Till dess är det väsentligt att alla vaccinationer ges på förutbestämt ställe. Därför skall BVC vaccinera penta- eller hexavalent vaccin enligt schemat **3 mån - höger lår, 5 mån - vänster lår och 12 mån - höger lår**, och Prevenar® ges i motstående lår, dvs **vä - hö - vä** vid samma åldrar.

Sammanfattning:

	3 mån	5 mån	12 mån
Infanrix-polio-HIB®, Pentavac® och Infanrix® hexa	hö	vä	hö
Prevenar®	vä	hö	vä

Kungsbacka den 7 maj 2007



barnhälsovårdsöverläkare