

BHVi 2006:6

BHVi

Råd och information från barnhälsovårdsöverläkaren

Angående MPR-vaccination vid äggallergi

Det har kommit till vår kännedom att barnkliniken får många remisser från BVC för MPR-vaccination av äggallergiska barn, även där allergin är lätt eller måttlig. Det är en gammal missuppfattning att denna kombination är farlig. Enligt nuvarande kunskapsläge gäller att:

Allergiska barn kan och bör vaccineras enligt gängse rutiner med två undantag:

- Det föreligger en specifik allergi mot någon vaccinkomponent. För de vaccin som för närvarande ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet (stelkramp, difteri, polio, mässling, påssjuka, röda hund och hemofilusinfektion) inträffar detta sällan. Inget av dessa vaccin är äggbaserade. Kontraindicerade vid äggallergi är t ex vaccin mot influensa och gula febern.
- Uttalat allergiska barn som tidigare reagerat med anafylaktiska tillbud eller andra svåra symtom i samband med injektioner utan att specifik allergi har kunnat påvisas mot någon komponent i det som injicerats (vaccin, lokalanestetika, röntgenkontrastmedel).

Om man efter upptagande av allergianamnes finner att det föreligger sådant undantag, skall barnet remitteras till barnspecialist för bedömning.

Om ingen av kontraindikationerna ovan föreligger kan barnet vaccineras. Detta sker under iakttagande av samma allergiberedskap som vid övrig vaccinationsverksamhet.

För ytterligare information hänvisas till PM-banken vid barnkliniken och barnallergisektionens PM:

<http://lina.lih.lthalland.se/barnet/pm-allmped/vaccallergi.htm>

<http://www.barnallergisektionen.se/stenciler/10.html>

Kungsbacka den 9 november 2006

Bernt Alm

barnhälsovårdsöverläkare