

VAS – Läkemedel NCS – ePed

Syfte

[Ordination med ordinationsvikt](#)

[Ordination med rimlighetskontroll](#)

[Ordination med ePedinstruktion](#)

[Beräkningshjälpen](#)

Beräkningshjälpen – Kroppsvikt

Beräkningshjälpen – Kroppsyta

Beräkningshjälpen – Dos


[Ordinationer med 2-stegsspädning](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)


Syfte

ePed är ett ordinationsstöd för förskrivare som ordinerar till barn 0–18 år (ej vid förskrivning av recept). Denna manual beskriver hur du som förskrivare går tillväga vid ordination med ordinationsvikt, rimlighetskontroll och ePedinstruktion.

Manualen beskriver även Beräkningshjälpen samt hur ordination med spädning i flera steg utförs.



NEWS	Temp	Bltr	Puls
-12	40	240	240
-10	39	200	200
-8	38	160	160
-6	37	120	120
-4	36	80	80
-2	35	40	40
0	34	0	0



Status	Ordination av	Vb	Dosering	Volymkonc	Ad...	Ka...
!	Ciprofloxacin Fresenius Kabi Infusionsvä...		100–100 ml		iv	o
✓	Brufen Oral suspension 20 mg/ml		10–10 ml		po	o
!	Alvedon Suppositorium 500 mg		2+2+2+2 st		pr	o
✓	Alvedon Oral lösning 24 mg/ml		10–10+10 ml		po	o

Ordination med ordinationsvikt

Gäller:

- Alla ordinationer till barn 0-18 år (ej vid förskrivning av recept).

Ordinationsvikt är tvingande, anges i **kg** och kan anges med maximalt 3 decimaler 1,725 kg.


0–1 mån: giltig 1 vecka

1–12 mån: giltig 1 mån

1–18 år: giltig 3 mån

Över 18 år: giltig 3 mån (ej tvingande att ange vid ordination)

Fältet blankas ut när giltighetstiden har gått ut.

Om vikten som registreras är utanför rimliga gränser visas en varningssymbol  med tooltip – *Ordinationsvikt inte inom rimliga gränser.*

Gränser för rimlig ordinationsvikt:


0–1 år: 0,3–15 kg

1–7 år: 9–35 kg


7–12 år: 16–65 kg

12–18 år: 25–110 kg


Det är endast en varning och ordinationen kan fortsätta.



Ordinationer skapas som tidigare via knappen Ord i Ordinationslistan.




- **Ordinationsvikt måste anges för att läkemedelsfälten ska öppnas upp** – inaktiva om ingen vikt har angetts.
- **Kommentar kan skrivas** om t ex vikten är uppmätt, angiven av förälder, en torrsvikt etc.



När en vikt har angetts så aktiveras läkemedelsfälten och selektering av läkemedel kan göras med eller utan Favorit §.

- Skriv läkemedlets/favoritens namn i rutan för läkemedel (räcker med de tre första bokstäverna). Tryck därefter **TAB**.




Sökning utan Favorit § - selekteringsdialog utifrån läkemedel/substans öppnas upp där rätt läkemedel får väljas i listan.

- **Markera** läkemedlet.
- Välj **OK**.

Alternativt

- **Dubbelklicka** på läkemedlet för att välja.




- Välj **Admin sätt**.
- Välj **Behandlingsorsak**.
- Välj vilken **Ordnationstyp** ordinationen ska ha.
- Fyll i **Dosering**.
- Fyll i **Enhet**.
- Fyll i **Admin tidpunkt** – börja alltid med lägsta klockslag med utgångspunkt från 00.00 om flera tidpunkter ska anges. Det räcker att skriva 2,8,14,20 utan mellanslag och sedan trycka TAB så blir tiderna automatiskt 02.00,08.00,14.00,20.00.
- **Kontrollera Insättningstidpunkt** och att tidpunkten för **Nästa dos** är korrekt, om inte korrigerar insättningstidpunkten så att tidpunkten för Nästa dos blir korrekt.
- Rimlighetskontrollen aktiveras om valt läkemedel ingår i denna.
- Välj **Spara**.


Ordination med rimlighetskontroll


Syftet med rimlighetskontrollen är att kvalitetssäkra ordinationer och ge ordinatören en hjälp att ordinera korrekt.


Det är den information som finns vid ordinationstillfället som kontrollen kommer att utföras mot. Vid rimlighetskontroll på Vid behovsordinationer görs denna utifrån enskild dos – ej dygnsdos.

- Texten **Inaktiv** visas med grått om rimlighetskontroll inte kan utföras. Tooltip visar varför den är inaktiv.
- Texten **Aktiv** visas när rimlighetskontrollen kan utföras.
- Om rimlighetskontrollen visar att en dos är t ex under- eller överskriden  men ordinationen ska fullföljas ändå måste kommentar skrivas.

När ordinationen öppnas via knappen Ändra, töms fältet ordinationsvikt om giltighetstiden är passerad. Övriga fält öppnas upp om vikt finns angiven.


Om tidigare kontroll visade under-/överskriden dos  och detta fortfarande gäller är fältet Kommentar öppet för ändring.

Om ändring görs och ordinationen blir rimlig visas symbolen  och texten Rimlig dosering. Fältet Kommentar inaktiveras och töms på text.



Längst ner i höger hörn i ordinationsdialogen finns rimlighetskontrollen.

Rimlighetskontrollen visas från början som **Inaktiv**. Genom att hålla muspekaren på ordet Inaktiv så visar tooltip vad som saknas för att få rimlighetskontrollen Aktiv.




Räk	Läkemedel	Substans	Form	Styrka	Markering	Grundstat	Anmning	Bevaktning	Bevaktning	Östytter
Ja	Furis Takeda Pharma AB	Fansensid	Tablett	20 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Furis Takeda Pharma AB	Fansensid	Tablett	40 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Furis Retard Takeda Pharma AB	Fansensid	Diprattkapsl...	30 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Furis Retard Takeda Pharma AB	Fansensid	Diprattkapsl...	60 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Fansensid Ciplinon Ciplinon AB	Fansensid	Tablett	40 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Fansensid Head Head AB	Fansensid	Tablett	40 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Fansensid Orlon Orlon Gen...	Fansensid	Tablett	40 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Fansensid Teva Teva Sweden AB	Fansensid	Tablett	40 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Impromil Es-Les Novamedic Med...	Laktos	Oral pulver L...	50 g	Hög	B3	III	III	III	Hög
Ja	Impromil Actavis AB	Fansensid	Tablett	20 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Impromil Actavis AB	Fansensid	Tablett	40 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Leis Retard Sandoz AB	Fansensid	Diprattkapsl...	30 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Leis Retard Sandoz AB	Fansensid	Diprattkapsl...	60 mg	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Impromil Actavis AB	Fansensid	Oral droppar...	10 mg/ml	Hög	C	III	III	III	Ja
Ja	Impromil Actavis AB	Fansensid	Tablett	300 mg	Hög	C	III	III	III	Ja

I rutan för **selektering av läkemedel/substans** finns en spalt till höger där det står **Ja** om läkemedlet har en rimlighetskontroll kopplad till sig.

Ca 55% av alla läkemedel i Sil har en rimlighetskontroll kopplad.

(Sil= Svenska informationstjänster för läkemedel).



- Fyll i **ordinationsvikt** om ingen vikt finns i fältet eller om vikten är förändrad.
- Skriv in det **Läkemedel** som ska ordineras med Favorit § eller utan.
- Välj **Admin sätt**.
- Välj **Ordinationstyp** om den förvalda inte är aktuell.
- Välj **Dosering**.
- Välj **doseringsenhet** om den förvalda inte stämmer.
- Välj **Admintidpunkt**.
- Rimlighetskontrollern visas som Aktiv om rimlighetskontroll finns kopplad till läkemedlet, doseringsenheten och administrationsätt.
-  Visas om **doseringen är rimlig**.
-  Visas om den **enskilda dosen är under-/överskriden** eller om **dygnsdosen är under-/överskriden** eller om den är en kombination av både enskild dos och dygnsdos.



Är dosen under- eller överskriden men ska ordineras ändå **måste kommentar skrivas** i rutan för kommentar rimlighetsavvikelse t ex. *Under-/överskriden dos är godkänd.*

I ordinationslistan ses symbolerna för rimlig dosering eller om ordinationen är under-/överskriden.

Muspekaren på symbolen visar en tooltip med mer information samt den ev angivna kommentaren.

R..	Ordnation av	Insatt	Utsatt	I	Ord
: Läkemedel					
!	Trimetoprim Meda Oral suspension 10 mg/ml	2017-02-22 14.08	2017-02-22 14.08		X
!	Ciprofloxacin Fresenius ... Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml	2017-02-27 14.03	--->		●●●
✓	Brufen Oral suspension 20 mg/ml	2017-02-26 08.00	--->		●●●
!	Alvedon Suppositorium 500 mg	2017-03-16 14.15	--->		●●●
✓	Alvedon Oral lösning 24 mg/ml	2017-02-15 11.37	--->		●●●
	Zyrlex Oral lösning 1 mg/ml	2017-02-22 13.28	--->		●●●

Utdelningslista 20111125-2381 ePed visningspatient, Flicka

Sök

Presentation från 170327 21.00 till 170328 21.00 Exkl. admin av patient

Händelsestidpunkt 170328 09.00

Status | Ordination av | I | Vb | Dosering

: Läkemedel

!	Ciprofloxacin Fresenius Kabi Infusionsvä...			100+100 ml
✓	Brufen Oral suspension 20 mg/ml			10+10 ml
!	Alvedon Suppositorium 500 mg			2+2+2+2 st
✓	Alvedon Oral lösning 24 mg/ml			10+10+10 ml
	Zyrlex Oral lösning 1 mg/ml		+	5+5+5 mg

I utdelningslistan ses symbolerna för rimlig dosering eller om ordinationen är under-/överskriden.

Muspekaren på symbolen visar en tooltip med mer information, samt den ev angivna kommentaren.

Ordnation med ePedinstruktion

- En ordination kan göras med hjälp av en ePedinstruktion.
- Region Hallands publicerade ePedinstruktioner finns på ePeds hemsida <http://eped.sll.sjunet.org/eped/> under Halland Barn.
- ePedinstruktionerna är kopplade eller kan kopplas till redan upplagda favoriter.


En ordination kan innehålla en ePedinstruktion och/eller en vanlig instruktion där hyperlänk kan läggas upp från en klinisk vårdriktlinje.

Vid ordinationsförändring där ePedinstruktion finns kommer länken att tas bort och listboxen ePedinstruktion blankas ut.

Ordningsförändring kan vara ändring av:


- Läkemedel
- Form
- Styrka
- Administrationssätt

- Spädning/tillsats




ePedinstruktioner är kopplade till favoriter.

- **Ordinera ett läkemedel med Favorit §.**
- **Finns en ePedinstruktion kopplad till favoriten visas denna i raden för ePedinstruktionen. Knappen Visa lyser grönt.**
- Tryck på **Visa** – ePedinstruktionen öppnas upp och kan läsas i sin helhet.
- Fyll i **Dosering** utifrån ePedinstruktionen.
- Välj **Behandlingsorsak**.
- Fyll i **Admin tidpunkt**.
- Kontrollera **Insättningstidpunkt**.
- Kontrollera så att **Nästa dos** är rätt tidpunkt utifrån tänkt ordination.
- Välj **Spara**.



I utdelningslistan syns symbol för ePedinstruktion om denna finns kopplad till ordinationen.

Dubbelklick på symbolen öppnar upp ePedinstruktionen.



Dubbelklick på symbolen för spädning/tillsats öppnar upp beredningsdialogen.

I Beredningsdialogen visas symbolen för ePedinstruktion – dubbelklick på symbolen öppnar upp ePedinstruktionen.

Beräkningshjälpen

Kan användas till alla patienter i NCS och kräver en ordinationsvikt. För barn finns rimlighetskontrollen även i beräkningshjälpen.

Ordination kan beräknas utifrån:

- Kroppsvikt
- Kroppsyta
- Dos

Beräkningen kan göras för:

- Dygnsdos
- Enskild dos

Den föreslagna doseringen kan ändras till en mer rimlig dos.

Beräkningshjälp 20111125-2381 ePed visningspatient, Flicka Ålder 5 år 4 mån

Beräkningsformel
 Kroppsvikt Kroppsyta Dos

Vikt
 Ordinationsvikt 28 kg 170314 Kommentar Uppmått vikt kg Längd
 Längd cm

Beräkning
 Dygnsdos Dos
 Fördelat på tillfällen
 vid tillfällen per dygn

Till ordinationsdialogen
 Adnan sätt Doseringseenhet mg
 Dosering Enhet Måttvatten
 mg ml

Beräkningsresultat

Ordination av	Dos (styrka)	Dos (mängd)	Dygnsdos (styrka)	Dygnsdos (mängd)	Dos/kg	Dygnsdos/kg
Zyllex Oral lösning 2 mg/ml	0 mg	0 ml	0 mg	0 ml	0 mg/kg	0 mg/kg

FASS

Rimlighetskontroll
 Inaktiv
 Kommentar rimlighetskontroll

OK Avbryt

Beräkningshjälpen – Kroppsvikt

Beräkningen kan ske per dygnsdos eller per dos och med olika beräkningsenheter.

- **Dygnsdos** – i fältet anges dygnsdos/kilokroppsvikt.
(Beräkningsenhet) – välj vilken enhet beräkningen ska utföras med.
- **Fördelat på ... tillfällen** – ange antal tillfällen/dygn.
- **Dos** – här anges dygnsdos per kilo kroppsvikt.
(Beräkningsenhet) – välj vilken enhet beräkningen ska utföras med.
- **Vid ... Tillfällen/dygn** – ange hur många utdelningstillfällen det ska vara/dygn.

- Öppna ordinationsdialogen och **påbörja ordinationen genom att söka upp**

Ny Ordination 20111125-2381 ePed visningsgränset, Ficka

Ordination av:

Vikt: Ordinationsvikt 35 kg 200423 Kommentar Uppsett vikt kg

Läkemedel: Godkänd läkemedel Icke godkänd läkemedel Fenestil BrelDol Läkemedel/Utbytbar FASS Beräkningsformel
 Läkemedel: Zovirax
 Form: Oral suspension Styrka 40 mg/ml Admin sätt: oral Adm som parenteral Inkl i värdetabellen
 ePedinstruktion: Ackälvra oral 40 mg/ml, (Zovirax) oral suspension

Behandlingsplan: Vård avskilj Följig Instruktion Beräkning

Dosering: Dosis: Enhet: Motvase: Admin tidpunkt: 08:00

Inläggning: datum 200423 kl 11:57
 Enst dos datum kl dos ml
 Nstta dos datum kl dos ml
 Senast utskick datum kl dos ml

Utsättning: Enst Dags Enst Doser
 Datum kl
 Permanent Tillfäll Kurser

Administration: Admin längd: Riklighetskontroll: Inaktiv Kommentar riklighetskontroll:

Admin av pat Med vrd insk

Läkemedlet med Favorit § eller utan.

- Tryck på knappen **Beräkn.hjälp** för att öppna dialogen.

Meddelande 20111125-2381 ePed visningsgränset, Ficka

Beräkning Kappell De

Vikt: Ordinationsvikt 35 kg 200423 Kommentar Uppsett vikt kg

Beräkning: Styrka Dos Dos/kg Beräkning
 Dos Styrka Dos/kg Beräkning

Behandlingsplan: Admin längd: Doseringsformel: Enst Motvase:

Riklighetskontroll: Inaktiv

Behandlingsplan	Dosering	Dos (mg)	Dos (mg/kg)	Dos (mg/kg)	Dos (mg/kg)	Dos (mg/kg)
Dosen 20 suspension Enst	40 mg/ml	1400 mg	40 mg/kg	40 mg/kg	40 mg/kg	40 mg/kg

Beräkning Kappell De

- Välj Beräkningsformel **Kroppsvikt**.
- Fyll i en **Ordinationsvikt** om detta inte finns, skriv ev en kommentar till ordinationsvikten.
- Under Beräkning välj **Dygnsdos** eller **Dos**.
- I **höger hörn** visas symbolen för **ePedinstruktion** om sådan finns – öppna denna genom dubbelklick på symbolen.
- Knapp för **Instruktion** visas också i **höger hörn**, denna lyser grönt om instruktion finns – tryck för att öppna.
- Rimlighetskontrollen** syns i denna dialog och används till barn 0–18 år.

Meddelande 20111125-2381 ePed visningsgränset, Ficka

Beräkning Kappell De

Vikt: Ordinationsvikt 35 kg 200423 Kommentar Uppsett vikt kg

Beräkning: Styrka Dos Dos/kg Beräkning
 Dos Styrka Dos/kg Beräkning

Behandlingsplan: Admin längd: Doseringsformel: Enst Motvase:

Riklighetskontroll: Inaktiv

Behandlingsplan	Dosering	Dos (mg)	Dos (mg/kg)	Dos (mg/kg)	Dos (mg/kg)	Dos (mg/kg)
Dosen 20 suspension Enst	40 mg/ml	1400 mg	40 mg/kg	40 mg/kg	40 mg/kg	40 mg/kg

Beräkning Kappell De

- När **Beräkningsformel** är vald och **dosen** är **angiven** visas en föreslagen dosering i fälten för **Till Ordinationsdialogen**.
- Denna dosering kan justeras vid behov. Doseringsenheten kan ändras t ex från ml till mg.
- I rutan för beräkningsresultatet visas **Dos** (styrka), **Dos** (mängd) och **Dos/kg**.
- Ange doseringen med rimlig mängd decimaler, välj **OK** för att spara.

Ny Ordination 2011125-2381 ePed visningspatient, Flicka

Ordination av: Läkemedel

Vikt: Ordinationsvikt 35 kg 200423 Kommentar: Uppmått vikt kg

Läkemedel: Godkända läkemedel Icke godkända läkemedel Favorit § Berörd Läkemedel Utbytbar FASS Gen. distrib. ord.

Läkemedel: Zovran Spädning/Ekstad

Farm: Oral suspension Stycka 40 mg/ml Adm.sätt: po Adm.som parenteral Inkl i viktberäkningen

ePedordination: Acklövt oral 40 mg/ml, Zovran oral suspension

Ordination: Behandlingsorsak: Välj orsak

Ordinationstyp: Stående

Dosering: Enhet: Motvaror: Adm tidpunkt: 00:00:00,00,12:00,18:00

Insättning: datum: 200423 kl 12:54

Uthållning: Eller: dagr Eller: doser

Etter-dos: datum: kl dos: ml Datum: kl

Nästa dos: datum: 200423 kl 18:00 dos: 6 ml

Sensat utskedd: datum: kl dos: ml

Administration: Adm.längd: Tak: Adm.av.på: Med vid mdr

Risikofaktorkontroll: Aktiv Riktig dosering (Acklövt) Kommentar: smittskyddsavdelning

Sparsa Sparsa + Fil Intersäk-kontroll Avbryt

- Doseringen från beräkningshjälpen följer med över till Ordinationsdialogen när önskad dosering sparats i beräkningshjälpen.
- Välj **Behandlingsorsak** genom att klicka på knappen **Välj orsak**.
- Kontrollera **Insättningstidpunkt** och **Nästa dos** och ändra vid behov.
- Välj **Sparsa**.

Beräkningshjälpen – Kroppsyta

Vikt och längd anges – uträkning av patientens kroppsyta beräknas.

- **Dygnsdos** – här anges dygnsdos/m² kroppsyta. (Beräkningsenhet) – välj vilken enhet beräkningen ska utföras med.
- **Fördela på ... tillfällen** – ange antal tillfällen/dygn.
- **Dos** – här anges dos/m² kroppsyta. (Beräkningsenhet) – välj vilken enhet beräkningen ska utföras med.
- **Vid ... Tillfällen/dygn** – ange hur många utdelningstillfällen det ska vara/dygn.

Ny Ordination 2011125-2381 ePed visningspatient, Flicka

Ordination av: Läkemedel

Vikt: Ordinationsvikt 35 kg 200423 Kommentar: Uppmått vikt kg

Läkemedel: Godkända läkemedel Icke godkända läkemedel Favorit § Berörd Läkemedel Utbytbar FASS Gen. distrib. ord.

Läkemedel: Zovran Spädning/Ekstad

Farm: Oral suspension Stycka 40 mg/ml Adm.sätt: po Adm.som parenteral Inkl i viktberäkningen

ePedordination: Acklövt oral 40 mg/ml, Zovran oral suspension

Ordination: Behandlingsorsak: Välj orsak

Ordinationstyp: Stående

Dosering: Enhet: Motvaror: Adm tidpunkt: 00:00

Insättning: datum: 200423 kl 12:57

Uthållning: Eller: dagr Eller: doser

Etter-dos: datum: kl dos: ml Datum: kl

Nästa dos: datum: kl dos: ml

Sensat utskedd: datum: kl dos: ml


Administration: Adm.längd: Tak: Adm.av.på: Med vid mdr

Risikofaktorkontroll: Inaktiv Kommentar: smittskyddsavdelning


Sparsa Sparsa + Fil Intersäk-kontroll Avbryt

- Öppna ordinationsdialogen och **påbörja ordinationen genom att söka upp läkemedlet med Favorit § eller utan**.
- Tryck på knappen **Beräkn.hjälp** för att öppna dialogen.


- Välj Beräkningsformel **Kroppsyta**.
- Fyll i en **Ordinationsvikt** om detta inte finns, skriv ev en kommentar till ordinationsvikten.
- Fyll i en **Längd**.
- Under Beräkning välj **Dygnsdos eller Dos**.



- I höger hörn visas symbolen för **ePedinstruktion** om sådan finns – öppna denna genom dubbelklick på symbolen.
- Knapp för **Instruktion** visas också i höger hörn, denna lyser grönt om instruktion finns – tryck för att öppna. **Rimlighetskontrollen** syns i denna dialog och används till barn 0–18 år.




- När **Beräkningsformel** är vald och dosen är angiven visas en föreslagen dosering i fälten för **Till Ordinationsdialogen**.
- Denna dosering kan justeras vid behov. Doseringsenheten kan ändras t ex från ml till mg.
- I rutan för beräkningsresultat visas Dos (styrka), Dos (mängd) och Dos/kg.
- Ange doseringen med rimlig mängd decimaler, välj **OK** för att spara.




- **Doseringen från beräkningshjälpen följer med över till Ordinationsdialogen** när önskad dosering sparats i beräkningshjälpen.
- Välj **Behandlingsorsak** genom att klicka på knappen **Välj orsak**.
- Kontrollera **Insättningstidpunkt** och **Nästa dos** och ändra vid behov.
- Välj **Spara**.

Beräkningshjälpen – Dos

Används när dosen är känd och man vill veta styrka och mängd per kilo kroppsvikt. Ordinationsvikt och dos krävs för denna beräkning.



- Öppna ordinationsdialogen och **påbörja ordinationen genom att söka upp läkemedlet med Favorit § eller utan.**
- Tryck på knappen **Beräkn.hjälp** för att öppna dialogen.



- Markera **Dos** i Beräkningsformeln.
- Ange en **ordinationsvikt** om detta inte finns.
- I **höger hörn** visas symbolen för **ePedinstruktion** om sådan finns – öppna denna genom dubbelklick på symbolen.
- Knapp för **Instruktion** visas också i höger hörn, denna lyser grönt om instruktion finns – tryck för att öppna. **Rimlighetskontrollen** syns i denna dialog och används till barn 0–18 år.
- Ange en **dosering**.
- I rutan för beräkningsresultat visas:
 - **Ordination av**
 - **Dos (styrka)**
 - **Doc (mängd)**
 - **Dygnsdos (styrka)**
 - **Dygnsdos (mängd)**
 - **Dos/kg**
 - **Dygnsdos/kg**
- Välj **OK** för att spara

- **Dosering från beräkningshjälpen följer med över till Ordinationsdialogen** när önskad dosering sparats i beräkningshjälpen.

Registrering av tillsats/spädning 20111125-2381 ePed visningspatient, Flicka

Grundordination
 Läkemedel Vancocycin Mylan Tag därav 500 Enhet mg
 Form Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Motsvarar 0 ml
 Stycka 500 mg

Tillsats/Spädning
 Ordinerade tillsatser/spädningar
 Godkända läkemedel Läkemedel Volym ml
 Form Volymkonc mg/ml
 Stycka Ny spädning Tag därav ml FASS Registrera

Ordination av	Typ	Dos enhet	Dos/volym i ml	Volymkonc	Tag därav
Vancocycin Mylan, Pulver till koncentrat till infu...	Grundordination	500 mg	0 ml		
Stellt vatten Fresenius Kab, Spädningvätska I	Spädning	10 ml			
Vancocycin Mylan, Pulver till koncentrat till infu...	Delesultat	50 mg/ml	2 ml		

Instruktion
 Vancocycin 500mg spädes med 10ml stelt vatten till stamkoncentration 50mg/ml
 Ordinerad mängd av stamkoncentrationen spädes vidare med NaCl 3mg/ml eller Glukos 50mg/ml till en slutkoncentration av max 5mg/ml
 Dos < 250 mg spädes med 50 ml
 250-500 mg spädes med 100 ml
 500-1000 mg spädes med 250 ml

OK Interaktionskontroll (C) Avbryt

Ordinerade tillsatser/spädningar.

Registrering av tillsats/spädning 20111125-2381 ePed visningspatient, Flicka

Grundordination
 Läkemedel Vancocycin Mylan Tag därav 500 Enhet mg
 Form Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Motsvarar 0 ml
 Stycka 500 mg

Tillsats/Spädning
 Ordinerade tillsatser/spädningar
 Godkända läkemedel Läkemedel Volym ml
 Form Volymkonc mg/ml
 Stycka Ny spädning Tag därav ml FASS Registrera

Ordination av	Typ	Dos enhet	Dos/volym i ml	Volymkonc	Tag därav
Stellt vatten Fresenius Kab, Spädningvätska	Spädning	10 ml			
Vancocycin Mylan, Pulver till koncentrat till infu...	Delesultat	50 ml	50 mg/ml	2 ml	
Vancocycin Mylan, Pulver till koncentrat till infu...	Slutesultat	1.923 mg/ml			

Instruktion
 Vancocycin 500mg spädes med 10ml stelt vatten till stamkoncentration 50mg/ml
 Ordinerad mängd av stamkoncentrationen spädes vidare med NaCl 3mg/ml eller Glukos 50mg/ml till en slutkoncentration av max 5mg/ml
 Dos < 250 mg spädes med 50 ml
 250-500 mg spädes med 100 ml
 500-1000 mg spädes med 250 ml

OK Interaktionskontroll (C) Avbryt

- Välj ny spädningvätska under Läkemedel t ex NaCl.
- Fyll i Volym.
- Välj Registrera.
- Ny Volymkoncentration presenteras.
- Välj OK för att spara.

Ny Ordination 20111125-2381 ePed visningspatient, Flicka

Ordination av Läkemedel
 Vikt 28 kg 170214 Kommentar Uppmått vikt kg
 Läkemedel Vancocycin Mylan Färdigt Bek.Död Läkem/subst FASS Gen.dräkthjälp
 Form Pulver till koncentrat till infusionsvätska Dubblett
 Stycka 500 mg Admin sätt iv Admin som parenteralt Inkl i väskbalansen
 ePedinstruktion Ordination utan ePedinstruktion Visa

Ordinationstyp Slående
 Doserang utifrån 1.923 mg/ml Volymkonc vid spädning Enhet ml Motsvarar 100 mg Admin tidpunkt

Insättning datum 170328 kl 14.13
 Extra dos datum kl dos ml
 Nästa dos datum kl dos ml
 Senast utdelad datum kl dos ml
 Utsläppning datum kl dos ml
 Efter dag/ Efter doser
 Datum kl
 Permanent Tillfällig Kontroll

Administration Admin längd Takt Admin av pat Med vid inskt
 Riskbedömskontroll Aktiv Undersöktes enskild dos (Vancocycin) Kommentar rimlighetsvärde

Spara Spara + File Interaktionskontroll (C) Avbryt

- Fyll i dosering utifrån spädningen.
- Finns det en koppling mellan det ordinerade läkemedlet och Rimlighetskontrollen är denna aktiv.

Uppdaterat från föregående version

Uppdaterad nya bilder 2020-04-23.