OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.
Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

Region Halland

Gäller för: Region Halland hälso- och sjukvård

Handläggning av sexuellt överförbara infektioner (klamydia, gonorré, syfilis) - smittspårning, behandling, smittskyddsanmälan

Hitta i dokumentet

Syfte
Bakgrund
Förfarande för remitterande vårdenhet
Remissinnehåll
När vårdenheten frångår rutinen och behandlar patienten själv
Uppdaterat från föregående version

Syfte

Klamydia, gonorré och syfilis är allmänfarliga sjukdomar som är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga enligt smittskyddslagen. Syfte med smittspårning av dessa diagnoser är att hitta vem index smittats av och vilka som kan ha smittats av index, för att förhindra ytterligare smittspridning.

Bakgrund

Ansvaret för smittspårning ligger, enligt smittskyddslagen, på behandlande läkare, men kan överlämnas till annan person med särskild kompetens. Smittspårning ska utföras i enlighet med Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner. Smittspårningshandlingar är inte en del av patientjournalen utan ska förvaras separat och vara inlåst eller i försvaras i säkra system. Gallring av smittspårningshandlingar sker enligt gallringsbeslut.

I Region Halland finns en centraliserad klamydiasmittspårning för att underlätta för behandlande läkare och kvalitetssäkra handläggningen. Denna centrala smittspårning utförs av ungdomsmottagningarna och STI-mottagningen i samarbete. **Ett krav för att få remittera patienten vidare är att behandling inte påbörjats** (undantag gäller vid svåra och akuta tillstånd som epididymit, salpingit eller konjunktivit; då behandlande läkare kan remittera smittspårningen och smittskyddsanmälan även om behandling påbörjats).

Förfarande för remitterande vårdenhet

Vårdenheten ska uppmärksamma riskbeteenden samt vara lyhörd för patientens sexuella hälsa och tecken på sexuellt överförda infektioner. De med symtom ska testas. Testning ska göras frikostigt av alla som haft oskyddat samlag med ny partner det senaste året. Vårdenheten ska samverka tvärsektoriellt i den utsträckning som patientens vård kräver det.

Patienten kan också själv välja att testa sig via Klamydiatest via nätet 1177.se.

I de fall patienter som testats positivt (till exempel via självtest 1177) för klamydia/gonorré väljer att söka sin vårdcentral ska hänvisning ske till Ungdomsmottagning/STI-mottagning som ombesörjer behandling, smittskyddsanmälan och att korrekt smittspårning sker.

Vid frågeställningar om sexuella besvär eller misstanke om sexuellt överförd infektion, inkluderande blodsmittorna hiv och hepatit, ska nödvändiga prover tas. Provtagning ska ske generöst. Vid positivt provsvar, ge muntliga och skriftliga förhållningsregler enligt Smittskyddsblad. Ha ett fördjupat samtal kring sexuellt risktagande och skydd, gärna enligt MI (Motiverande samtal) - Socialstyrelsen. Informera patienten om att smittspårning och behandling sker via Ungdomsmottagning/STI-mottagning och att patienten blir kontaktad via 1177.se eller via telefon (visas som 010-184 80 04).

Remittera patienten enligt nedan:

- **Positiv klamydia hos patienter under 24 år**
  Remitteras till Klamydiasmittspårning UM (Smittspår klamydia i Cosmic)
- **Positiv klamydia hos patienter över 24 år**
  Remitteras till STI mottagning (STI mottagning Halmstad/Varberg i Cosmic)
- **Positiv klamydia hos gravida (oavsett ålder)**
  Remitteras till STI mottagning (STI mottagning Halmstad/Varberg i Cosmic)
- **Positiv gonorré och syfilis eller flera samtidiga STI-infektioner (oavsett ålder)**
  Remitteras till STI mottagning (STI mottagning Halmstad/Varberg i Cosmic)

Vårdenheten medverkar till ökad följsamhet genom att remittera patienter för smittspårning, smittskyddsanmälan och behandling.

Remissinnehåll

Enligt rutin Manual Cosmic – Skicka remiss (Vårdbegäran eller Konsultationsremiss) remissinnehåll

- + Korrekt mobilnummer
- + Kan inte uppgiften sökas i Cosmic måste uppgiften stå i remissen (Ex. vid användning av annat labb).

När vårdenheten frångår rutinen och behandlar patienten själv

Observera att om behandlande läkare frångår rutinen och ger behandling så kvarstår ansvaret för smittspårning och smittskyddsanmälan hos behandlande läkare.

Undantag: Vid svåra och akuta tillstånd och/eller epididymit, salpingit eller konjunktivit; kan behandlande läkare remittera smittspårningen och smittskyddsanmälan även om behandling påbörjats.

Se Terapirekommendationer Halland (regionhalland.se) för mer information.

Smittspårning vid sexuellt övergrepp

Om positivt provsvar erhålls efter provtagning i samband med spårsäkring vid övergrepp:

- Inga uppgifter om misstänkt förövare ska forceras fram, men de uppgifter som framkommer delges av behandlande läkare till Smittskydd via paragrafanmälan (§3:5) i Sminet. Observera att paragrafanmälan på misstänkta förövare skall göras även om specifika uppgifter saknas. Smittspårning av misstänkta förövare omhändertas därefter av Smittskydd och polis.
- Remittera patienten till UMO/STI för smittspårning av övriga frivilliga sexuella kontakter. Notera i remiss att övergrepp skett så att smittspåraren blir medveten om det och kan anpassa handläggning.

Uppdaterat från föregående version

2026-10-16 Tillägg av nytt stycke: Smittspårning vid sexuellt övergrepp.