

# Handläggning av sexuellt överförbara infektioner- smittspårning, behandling, smittskyddsanmälan

---

## Hitta i dokumentet

[Syfte](#)[Effekt](#)[Bakgrund](#)[Kunskap](#)[Förfarande remitterande vid vårdvalsenheter](#)[Förfarande remitterande vid  
specialistvård/kvinnokliniken](#)[Förfarande remitterande vid  
kvinnohälsovården](#)[Remissinnehåll](#)[När vårdvalsenhet frångår rutinen och  
behandlar patienten själv](#)[Uppdaterat från föregående version](#)

## Syfte

Öka säkerheten vid provtagning, smittspårning och behandling för sexuellt överförbara infektioner gällande klamydia, gonorré och syfilis som är anmälningspliktigt enligt [smittskyddslagen](#).

## Effekt

Smittspårning är ett känsligt och krävande arbete, som utfört på rätt sätt begränsar smittspridningen. Smittspårning blir effektivare när läkare remitterar till erfarna smittspårare.

## Bakgrund

Med nuvarande arbetssätt gällande infektion klamydia, gonorré och syfilis medför olika tillvägagångssätt på vårdvalsenheterna risker. För att skapa god kvalitet, säkerhet och dessutom förenkla processen har nedanstående rutin framtagits.

## Kunskap

[Terapirekommendationer Halland \(regionhalland.se\)](#).

Smittspårning ska utföras i enlighet med [Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner](#). Smittspårningshandlingar ska förvaras inlåsta eller i patientsäkert system eller inlåsta. Gallring av handlingar sker enligt gallringsbeslut.

## Förfarande remitterande vid vårdvalsenheter

Vårdvalsenheten ska uppmärksamma riskbeteenden samt vara lyhörd för de listades sexuella hälsa och tecken på sexuellt överförda infektioner. De med symtom ska testas. Testning ska göras frikostigt av alla som haft oskyddat samlag med ny partner under det senaste året. Vårdvalsenheten ska samverka tvärsektorielt i den utsträckning som patientens vård kräver det.

[Klamydiatest via nätet 1177.se](#) är en väg, där patienten själv kan testa sig.

I de fall patienter som testats positivt för klamydia ändå väljer att söka sin vårdvalsenhet ska hänvisning ske tillbaka till Ungdomsmottagningen, STI-mottagningen alternativt Central klamydiasmittspårning som ombesörjer att både behandling och korrekt smittspårning sker.

### **Vårdvalsenheten medverkar till ökad följsamhet genom att remittera patienter för smittspårning, smittskyddsanmälan och behandling.**

#### **Vårdvalsenheten ska:**

- Vid frågeställningar om sexuella besvär eller misstanke om sexuellt överförd infektion, inkluderande blodsmittorna hiv och hepatit, ta nödvändiga prover. Provtagning ska ske generöst. Vid positivt provsvar, ge muntliga och skriftliga förhållningsregler enligt [Smittskyddsblad](#).
- Ha ett fördjupat samtal kring sexuellt risktagande och skydd, gärna enligt [MI-metoden](#).
- Remittera patienter med positiv klamydia till Central klamydiasmittspårning (Smittspår Klamydia i Cosmic) för behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan.
- Remittera patienter med positiv gonorré, kombination gonorré/klamydia eller syfilis till STI-mottagningen för behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan (STI-mottagningen Halmstad/Varberg i Cosmic).
- Informera om att smittspårning och förskrivning av behandling sker via Central klamydiasmittspårning. Enheten kontaktar patienten via 1177.se eller via telefon (visas som 010-184 80 04).

#### **Förfarande remitterande vid specialistvård/kvinnokliniken**

- Vid positivt resultat av klamydia ges behandling, remittera för smittspårning och smittskyddsanmälan till STI-mottagningen (Smittspår Klamydia i Cosmic).
- Vid positivt resultat av gonorré, kombination gonorré/klamydia eller syfilis, remittera för behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan till STI-mottagningen (STI-mottagningen Halmstad/Varberg i Cosmic).
- Ge muntliga och skriftliga förhållningsregler enligt [Smittskyddsblad](#).
- Informera om vikten av att patienten svarar på samtal gällande smittspårning och att hen kommer bli kontaktad via 1177.se eller via telefon (visas som 010-184 80 04).

#### **Förfarande remitterande vid kvinnohälsovården**

- Vid positivt resultat klamydia hos gravid ges behandling.
- Ge muntliga och skriftliga förhållningsregler enligt [Smittskyddsblad](#). Smittspårning och smittskyddsanmälan remitteras till Central klamydiasmittspårning (Smittspår Klamydia i Cosmic).
- Remittera patienter med positiv gonorré, kombination gonorré/klamydia eller syfilis till STI-mottagningen på hudkliniken för behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan (STI-mottagningen Halmstad/Varberg i Cosmic).
- Vid positivt svar av klamydia hos icke gravid remitteras patienten till Central klamydiasmittspårning för behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan (Smittspår Klamydia i Cosmic).
- Patienten informeras om vikten av kontakt gällande smittspårning enligt smittskyddslagen och kommer bli kontaktad av Centrala klamydiasmittspårning.

- Patienten kan bli kontaktad via 1177.se eller via telefon (visas som 010-184 80 04).

## Remissinnehåll

Enligt rutin [Manual Cosmic – Skicka remiss \(Vårdbegäran eller Konsultationsremiss\) remissinnehåll](#)

- + Korrekt mobilnummer
- + Kan inte uppgiften sökas i Cosmic måste uppgiften stå i remissen (Ex. vid användning av annat labb).

## När vårdvalsenhet frångår rutinen och behandlar patienten själv

Observera att om provtagande läkare frångår rutinen och ger behandling så kvarstår också ansvaret för smittspårning och smittskyddsanmälan hos behandlande läkare.

**Undantag** från denna regel gäller vid klinisk bild av epididymit, salpingit eller konjunktivit; i dessa fall ska provtagande läkare påbörja behandling utan dröjsmål och kan ändå remittera smittspårning och smittskyddsanmälan till STI-mottagningen.

All STI-smittspårning ska ske enligt [Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner](#).

### Uppdaterat från föregående version

2025-03-28 Uppdateringar inför journalbyte.

Förtydligt hänvisning till Socialstyrelsens vägledning om smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner.