

Hanteringsanvisning för Comirnaty barnformulering färdigspädd

– mRNA- vaccin mot covid-19

Observera att det finns olika hanteringsanvisningar för Comirnaty. Den här anvisningen avser:

Comirnaty Omicron XBB1.5 Barnformulering styrka 10 mikrog/dos till barn 5-11 år
Färdigspädd (Blått lock)

1. Hållbarhet

- Hållbarhet i kyl är 10 veckor, se etikettmärkning på kartongen.
- Förvars vid rumstemperatur i högst 12 timmar före första punktion

2. Vaccinet är färdigt för användning (ska inte spädas)

- Injektionsflaskan innehåller motsvarande 6 doser à 0,3 ml.
- Vänd den upptinade injektionsflaskan försiktigt 10 gånger. Får ej skakas!
- Kontrollera att vätskan är vit till offwhite (gäller både injektionsflaskan och uppdragen dos i sprutan). Vätskan får innehålla vita/transparenta partiklar.
- Injektionsflaskorna ska märkas med datum och tidpunkt efter uttag av första dos.

Punkterad injektionsflaska ska användas inom 12 timmar

3. Beredning av enskilda 0,3 ml doser av Comirnaty

- Desinficera injektionsflaskans gummimembran med klorhexidinsprit.
- Injektionsflaskan motsvarar 6 doser á 0,3 ml.
- Koppla en 1 ml spruta med fast kanyl (23 gauge eller 25G) och låg dödvolum.
- Dra upp 0,3 ml. Avlägsna eventuella luftbubblor med nålen kvar i flaskan för att minska risk för förlust av vaccin.
- Om kvarvarande mängd vaccin i injektionsflaskan inte räcker till en full dos på 0,3 ml, kasta injektionsflaskan och resterande volym.
- Injicera intramuskulärt.
- Uppdragen dos ska användas inom 12 timmar

4. Avfallshantering

- Samla inte vaccin från flera injektionsflaskor. Kassera oanvänt vaccin
- De använda injektionsflaskorna ska destrueras så att det inte kan användas igen, kassera dem i riskavfallsbehållare.

Uppdaterat från föregående version

2024-02-29 Redaktionell ändring. Borttag av inaktuell länk.

Ny rubrik 4. Avfallshantering – ingen förändring i sakinhåll.

Tidigare versionshistorik

2023-12-05 Uppdaterat vaccin Comirnaty Omicron XBB 1.5

2023-06-16 Redaktionell ändring. Byte av länk.

2022-06-09 Uppdaterad utefter ny formulering som är färdigspädd Comirnaty. Ersätter tidigare version gällande transporterbara doser Comirnaty.

Redaktionell ändring

Lagt till - Om kvarvarande mängd vaccin i injektionsflaskan inte räcker till en full 6:e dos på 0,3 ml, kasta injektionsflaskan och resterande volym.