

Hanteringsanvisning för Nuvaxovid - vaccin mot covid-19 Novavax

Hanteringsanvisningen gäller för Nuvaxovid XBB 1.5.

1. Hantering före användning

- Transporteras kylt (2-8° C).
- Förvaras i kylskåp (2-8° C), får ej frysas.
- Öppnad injektionsflaska har en hållbarhet på upp till 12 månader vid förvaring i kylskåp (2-8° C). Se tryckt utgångsdatum på förpackningen.
- Punkterad injektionsflaska ska användas inom 6 timmar vid rumstemperatur (upp till 25° C). Efter denna tidsperiod ska produkten kasseras. Ställ inte tillbaka den i kylskåpet.
- Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen då vaccinet är ljuskänsligt.

2. Vaccinet är färdigt för användning (ska inte spädas)

- Injektionsflaskan innehåller motsvarande 5 doser á 0,5 ml.
Om kvarvarande mängd vaccin räcker till ytterligare fulla doser så kan det iordningställas och administreras.
- Vänd injektionsflaskan försiktigt. Får ej skakas!
- Kontrollera att vätskan är färglös till svagt gul, klar dispersion. Inga synliga partiklar och/eller missfärgning får förekomma.
- Injektionsflaskan ska märkas med datum och tidpunkt efter uttag av första dos.

Punkterad injektionsflaska ska användas inom 6 timmar

3. Beredning av enskilda 0,5 ml doser av Nuvaxovid

- Desinficera injektionsflaskans gummimembran med klorhexidinsprit.
- Vänd injektionsflaskan försiktigt. Får ej skakas!
- Använd en 1 ml spruta med kanyl 23G eller 25G och låg dödvolym.
Inför eventuell transport ska 1 ml spruta **utan** fast kanyl användas, säkra uppdragen dos genom plombering med engångsskyddspropp.
- Dra upp vaccin till sprutans markering på 0,50 ml. Avlägsna eventuella luftbubblor med nålen kvar i flaskan för att minska risk för förlust av vaccin.
- Injicera intramuskulärt.
- **Uppdragen dos ska användas inom 6 timmar (högst 25 °C)**

4. Avfallshantering

- Samla inte vaccin från flera injektionsflaskor. Kassera oanvänt vaccin.
- Använda injektionsflaskor kasseras i riskavfallsbehållare.

Uppdaterat från föregående version

2024-02-29 Lagt till - Hanteringsanvisningen gäller för Nuvaxovid XBB 1.5.

Tidigare versionsuppdateringar

Ändrat antal doser/injektionsflaska.

Lagt till ett stycke om transport - Inför eventuell transport ska 1 ml spruta **utan** fast kanyl användas, säkra uppdragen dos genom plombering med engångsskyddspropp.

Redaktionell ändring.

2022-03-07 Ny hanteringsanvisning