

Uppstart av parenteral nutrition i hemmet

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)

[Länk till regional eller förvaltningsövergripande rutin](#)

[Bakgrund](#)

[Genomförande](#)

[Dokumentation](#)

[Registrering](#)

[Kommunikation](#)

[Uppföljning](#)

[Relaterad till följande processer:](#)

[Relaterade sökord:](#)

[Bilagor:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Beskriver uppstart av parenteral nutritionsbehandling i hemmet för patienter inom den specialiserade öppenvården.

Bakgrund

Ättsvårigheter till exempel aptitlöshet, illamående, tugg- och sväljsvårigheter leder snabbt till ett minskat energi- och proteinintag. Om det minskade energi- och proteinintaget fortgår under en tid, resulterar detta i en ofrivillig viktörlust och försämrat nutritionstillstånd. Nedsatt nutritionstillstånd kan ge sämre utgångsläge för övrig medicinsk behandling. Om patienten inte kan tillgodose energi- och proteinintag per oralt och parenteral nutritionsbehandling bedöms vara aktuellt kan denna ibland behöva startas upp i hemmet, då patientens tillstånd inte kräver inläggande sjukhusvård.

Genomförande

- Läkare skriver remiss till patientens vårdcentral för inskrivning i Hemsjukvården. Remissen ska redogöra för:
 - vilken infart patienten har
 - indikation till nutritionsbehandlingen
 - när patienten planeras starta
- Läkaren förskriver näringslösning inklusive tillsatser utifrån dietistens bedömning. I receptet ska infusionstid tydligt framgå samt när denna ska ske, dagtid/natttid
- Läkare förskriver pump/ryggsäck och droppställning med hållare
- Sjuksköterska på mottagning initierar inskrivning i hemsjukvården genom kontakt med patientens vårdcentral
- Dietist bedömer nutritionsbehandling och föreslår lämplig parenteral nutrition samt ansvarar för uppföljning

Näringslösning/tillsatser

- Läkare förskriver:
 - näringslösning (t ex SmofKabiven)
 - tillsatser (Addaven, Soluvit, Vitalipid)
 - injektionsvätska NaCl 9 mg/ml (Braun) 20x20 ml för spolning av porten
 - klorhexidinsprit 5 mg/ml 250 ml (ingår ej i läkemedelsförmånen)
- Patient/anhörig/personal inom Hemsjukvården beställer vätskor via Apoteket

Infusionsaggregat och sprutor

- Sjuksköterska inom Hemsjukvården beställer infusionsaggregat samt övriga tillbehör

Infusionspump, ev ryggsäck och droppställning

Läkare förskriver pump/ryggsäck samt ev droppställning/hållare genom att fylla i blanketten "[Ordination av medicintekniskt behandlingshjälpmedel](#)" med nedanstående benämning och artikelnummer. Individnummer fylls i av MTA. Sjuksköterska/dietist kontaktar MTA HSV tel. 81139, HSH och HSK tel. 31979 för beställning/leverans till patienten i hemmet.

Benämning	Artikelnummer
Minirhythmic infusionspump	45512
Ryggsäck	45509
Droppställning	12178
Hållare	45515

Ordination för provtagning

- Remiss för provtagning: Fosfat, Kalium samt Magnesium i samband med uppstart dagligen under 3 dagar.

Bilagor:

Bilaga : [Ordination av medicintekniskt behandlingshjälpmedel](#)

Uppdaterat från föregående version

Redaktionella ändringar i meta-data.
Ersätter 2022-03-07