

Rygg, Skolios - nattkorsett

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Beslut om korsettbehandling](#)
[1 Underlag till Aktiv Ortopedteknik:](#)

[2 Remiss för kontroll-rtg:](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Beskrivning av handlingsplan för behandling med nattkorsett på barn med skolios.

Beslut om korsettbehandling

- Remiss + underlag (se spec 1 på nästa sida) skickas till Aktiv Ortopedteknik, Halmstad (läk/sekr Hsh/HsV).
- Remiss skickas till fysioterapeut, Rehabkliniken Halmstad.
- Remiss för kontrollröntgen med korsett 2 veckor efter leverans, samt utan korsett 4 månader efter leverans inför uppföljning skrivs. (se spec 2 för vilken typ av röntgenremiss).
- Aktiv Ortopedteknik bokar in patienten utifrån inkommande remiss för mätning och meddelar datum för leverans till fysioterapeut och sekreterare på respektive ort HSH/HsV.
- Fysioterapeut bokar in och kallar patienten samma dag som leverans sker av korsetten via Aktiv Ortopedteknik. Patientinformation bifogas kallelsen.
- Tid för kontrollröntgen cirka 2 veckor efter korsettleverans bokas av sekreterare på respektive ort Hsh/HsV.
- Sekreterare på respektive ort HSH/HSV bevakar att röntgen utförts och meddelar ansvarig läkare via JO20 som granskar bilderna.
- Sekreterare Hsh/HsV bokar därefter in telefonuppföljning inom en vecka. I de fall telefontider är fullbokade kan uppföljning ske via brev.
- Sekreterare på respektive ort HSH/HSV skickar röntgenbild + röntgensvar till Aktiv Ortopedteknik.
- Patienten sätts upp på väntelista för återbesök 4 månader med röntgen ståendes utan korsett. Patienten ska då INTE sova i korsetten inför röntgen.
- Återbesök till Aktiv Ortopedteknik/fysioterapeut kan bokas vid behov av förälder.

- Patienten sätts upp på väntelista för återbesök 4 månader med röntgen ståendes utan korsett. Patienten ska då INTE sova i korsetten inför röntgen.
- Återbesök till Aktiv Ortopedteknik/fysioterapeut kan bokas vid behov av förälder.

1 Underlag till Aktiv Ortopedteknik:

- senaste rygg-röntgen (obs, hela kotpelaren),
- vilken är den primära kröken, rotationsinslag?
- storlek och nivå på krök; apex/vilka kotor man mätt kröken på,
- tacksamt, ej nödvändigt; skelett-ålder/förväntad tillväxt.

2 Remiss för kontroll-rtg:

- Kontroll-röntgen för nattkorsett; patient ska sova med korsetten på och helst ha den på tills röntgen är gjord (morgontid). Röntgen görs **liggandes**.
- Kontroll-röntgen för dagkorsett; patienten ska sova med korsetten på och helst ha den på tills röntgen är gjord (morgontid). Röntgen görs **stående**.
- Röntgen inför uppföljning; patienten ska ha varit **utan korsett i 24h**. Röntgen görs **stående utan korsett**. Gäller såväl natt- som dag-korsett.

Boka in patienten på en morgontid, gärna kl. 08.00. Patienten sover hela natten i korsetten. Patienten får ta av sig korsetten under transport till röntgen, men kan om möjligt behålla den på under transporten i annat fall sätts den på igen och dras åt maximalt och genomför röntgenundersökningen.

Patienten och vårdnadshavare får själva kontakta fysioterapeut om de önskar besök i samband med röntgen.

Uppdaterat från föregående version

Ersätter 2021-06-24.
Ändrat rubriken till rygg.

Dokumentet ändrat i sin helhet.