OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.
Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

Region Halland

Gäller för: Privata Vårdgivare; Röntgenmottagningen Halmstad

Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - mall

Bilaga 2 till rutin: Ordination enligt generella direktiv

Generella direktiv vid Röntgenkliniken Halmstad sjukhus_____

Enligt SOSFS 2000:1 får läkemedel utdelas av *sjuksköterska enligt* ***skriftliga generella direktiv****. Detta måste ske med stor restriktivitet och läkare skall ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinering. Given dos skall registreras som tillfällig ordination i läkemedelsjournal* och signeras. OBSERVERA att i första hand ska stående vid behovsordination användas. Sådan ordination bör alltid finnas på patienter med känt eller förväntat sömnproblem, oro, smärtanfall, krampsjukdom. Behandling får ej ges vid överkänslighet mot ingående substanser

Indikation	Läkemedel	Mängd	Max antal doser per dygn utan läkarordination	Kontraindikationer
Intravenöst eller intramuskulärt vid MR-undersökningar för tarmrelaxans om inga kontraindikationer	**Buscopan**	**20-40 mg**		

Fastställd av: Verksamhetschef, Fastställt: 2025-12-19
Huvudförfattare: Holmgren Malin ADH RTG
Medförfattare: Erlinge Sofia ADH RTG

Indikation	Läkemedel	Mängd	Max antal doser per dygn utan läkarordination	Kontraindikationer
förekommer				
Intravenöst eller intramuskulärt vid MR-undersökningar för tarmrelaxans om inga kontraindikationer förekommer	**Glucagon**	**0,5-1mg**		
Spolning av intravenös infart SVP=Port-A-Cath	**Inj NaCl 9 mg/ml Engångsbehållare**	**10 ml PVK 20 ml CVK/SVP Använd minst 10 ml spruta**	**Vid behov**	
Ytanestesi av huden vid nålstick	**Kräm Emla**	**1-2 gram/cm2**	**1**	

Fastställd av: Verksamhetschef, Fastställt: 2025-12-19
Huvudförfattare: Holmgren Malin ADH RTG
Medförfattare: Erlinge Sofia ADH RTG

Indikation	Läkemedel	Mängd	Max antal doser per dygn utan läkarordination	Kontraindikationer
Sedering av orolig patient vid undersökning	**Midazolam injektionslösning 1 mg/ml**	**<60 år: 2,5 ml initialt, därefter bolusdos 1 ml >60 år/svaga, kroniskt sjuka: 0,5-1 ml initialt, därefter bolus 0,5-1 ml**	**<60 år: 5 ml >60 år/svaga/kroniskt sjuka: 3,5 ml**	**Känd överkänslighet, andningsinsufficiens**
För bättre visualisering av kärl vid nålsättning	**Salva Glycerylnitrat**	**1% i Essex.**	**Vid behov**	
Intravenöst vid CT colon för tarmrelaxans om inga kontraindikationer förekommer	**Buscopan**	**20 mg**	**Vid behov**	

Fastställd av: Verksamhetschef, Fastställt: 2025-12-19
Huvudförfattare: Holmgren Malin ADH RTG
Medförfattare: Erlinge Sofia ADH RTG

Indikation	Läkemedel	Mängd	Max antal doser per dygn utan läkarordination	Kontraindikationer
Intramuskulärt vid CT kolon för tarmrelaxans, om inga kontraindikationer framkommer	**Glucagon**	**1 mg**	**Vid behov**	
Vid anafylaktisk reaktion	**Epipen adrenalinpenna**	**300 alt. 150 mg**	**Per dos**	

Fastställd av: Verksamhetschef, Fastställt: 2025-12-19
Huvudförfattare: Holmgren Malin ADH RTG
Medförfattare: Erlinge Sofia ADH RTG