

Injektion – Preop-bedömning inför intravitreal injektion med anti-VEGF

Hitta i dokumentet

[Preoperativ bedömning](#)
[Avstå injektion vid:](#)
[Injektion kan ges vid:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Preoperativ bedömning

Avstå injektion vid:

- Akut vagel i injektionsögat* (Rodnad, svullnad, ömhet, ev. pus).
- Akut konjunktivit i något av ögonen*.
- Uttalad blefarit* (svullen ögonlockskant, meibomit).
- Akut ÖLI (nydebuterad feber, hosta, halsont).
- Akut infektion, men injektion kan ges om pågående antibiotikabehandling har gett effekt och symtomen avklingat.
- Tandläkarbesök med rotfyllning eller inflammerad tand senaste veckan. Undvik tandläkarbesök, inklusive tandhygienist, tre dagar före och tre dagar efter injektionen.
- Relativ kontraindikation vid stroke eller hjärtinfarkt senaste 3 månader, diskutera med läkare.
- Kontaktlinsfrihet mindre än två dygn före injektionen. Avstå kontaktlins minst två dygn efter injektionen.

*) Ordination Ocg kloramfenikol x 3- 4 bilateralt i 7-10 dagar. Ny injektionstid inom 5-7 dagar.

Injektion kan ges vid:

- Lokal vagel i andra ögat.
- Kalkinfarkt (äldre förändring utan rodnad, svullnad eller ömhet. Inget pus).

Uppdaterat från föregående version

Redaktionell ändring, ändrat tandläkarbesök 3 dagar före och 3 dagar efter injektion.