

# Inläggning av permanent pleura- eller ascitesdränage (PleurX™/PeritX™)

---

## Hitta i dokumentet

[Provtagning](#)  
[Förberedelser](#)  
[Premedicinering](#)

[Eftervård](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

Informera patienten. Viktigt att patienten är medveten om att det rör sig om ett permanent (oftast livslång) dränage och vad det innebär.

Häftet "[Information till dig som ska få en PleurX™ kateter](#)" bör finnas till hands på kliniken som är beställare (beställs via Ewimed Sweden AB).

Viktigt att veta vem som ska sköta dränaget och att [personalen är utbildad](#) i rätt förfarande. Kontrollera detta innan.

Pat skall ha en fungerande PVK och ska transporteras i säng till väntrum i patientskjorta. [Checklista för PleurX / PeritX dränage](#) ska följa med patienten till Röntgen.

## Provtagning

- Antikoagulantibehandling skall vara utsatt innan ingreppet enligt [\(PM\)](#).
- Vid dubbel thrombocythämning ett av medlet (Thrombyl) kan eventuellt bibehållas.
- Blödningsprover (*TPK, PK*) + Hb och Kreatinin skall tas samma dag(24h).

## Förberedelser

- Pat skall vara fastande minst fyra timmar innan undersökning.
- Eventuella befintliga drän i aktuellt område skall vara avlägsnat minst 3 dagar innan ingrepp.
- Kontroll med ultraljud, för att säkerställa att tillräcklig mängd vätska finns i aktuella område, görs innan kateterinläggning.
- Patient skall ha duschat och transporteras till röntgen i ren säng.

## Premedicinering

Smärtlindrande/anxiolytisk *medicinering* som vid pyleostomiinläggning [\(PM\)](#).

Antibiotikaprofylax vid ascitesdrän: 1 tablett Bactrim Forte och 3 tabletter Flagyl 400 mg, ges 1,5–2 timmar före ingreppet.

## Eftervård

Patienten observeras på beställande avdelning/mottagning.

- Sängläge i två timmar.
- Regelbunden kontroll av blodtryck, puls, medvetandegrad.
- Smärtlindring vid behov.
- Komplet tappning eftersträvas.
- Om patienten mår bra kan hemgång ske efter 3–4 timmar.
- Fortsatt tappning och omläggning sköts, planeras av beställande klinik.
- Hudsuturena tas efter 10 dagar och fixeringssutur runt katetern tas efter 30 dagar.

### **Uppdaterat från föregående version**

2025-03-20 Årlig uppdatering. Uppdaterat länkar samt lagt in länk till checklisten.