Region Halland

Generella ordinationer - Ögonkliniken

Hitta i dokumentet

Omvårdnad
Pupilldilatation, inför läkarbesök, inför fotografering
Pupilldilatation inför kataraktoperation
Pupilldilatation inför kataraktoperation vid överkänslighet mot konserveringsmedel
Preoperativt inför injektionsbehandling med Lucentis/Eylea
Bedövning spoldropp
Cilier, retning öga/ögon
Skia, pupilldilatation barn yngre än 1 år
Skia, pupilldilatation barn äldre än 1 år
Tonusmätning, inspektion kornea
Indocyaningrön angiografi – ICG
Fluoresceinangiografi – FAG
Vid oro inför operation/behandling
Värk
Uppdaterat från föregående version

Enligt SOSFS 1995:19 får läkemedel utdelas av sjuksköterska genom generella direktiv Detta måste ske med stor restriktivitet och läkare ska ta ställning till eventuell fortsatt medicinering.

Given dos ska dokumenteras i journalen.

Pupilldilatation, inför läkarbesök, inför fotografering

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
Ocg. Tropikamid 0,5 %	1-2 droppar	Trångvinkelglaukom	Max effekt 20-25 min
Ocg. Phenylephrine 2,5 %	1-2 droppar		
Ocg. Cyclopentolat 1 %	1-2 droppar	Trångvinkelglaukom	Max effekt 20 min

Pupilldilatation inför kataraktoperation

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
Ocg. Cyklopentolat-Fenylefrine 0,85 % + 1,5 % (Kombinationsdroppe)	1-2 droppar	Trångvinkelglaukom	

Pupilldilatation inför katarakt-op vid överkänslighet mot konserveringsmedel

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
Ocg. Cyclopentolat 1 %, ocg. Phenylephrine 2,5 %	1 droppe vardera x 2	Trångvinkel-glaukom. Försiktighet vid thyreotoxikos, hypertension och hjärt- kärlsjukdom.	

Preoperativt inför intravitrial injektion

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
Ocg. Oxibuprokain 0,4 %	1 droppe vardera x 2		

Bedövning spoldropp

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
Ocg. Oxibuprokain 0,4 %	1-2 droppar	Användes ej långvarigt	Bedövningstid: 20 sekunder – 10 min
Alt. 2 Ocg. Tetrakain 1 %	1-2 droppar	Användes ej långvarigt	Bedövningstid: 20 sekunder – ca 15 min

Cilier, retning öga/ögon

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
Ocul. Kloramfenikol 10 mg/g	En salvsträng innanför nedre ögonlocket.	Överkänslighet mot kloramfenikol eller salvbas med lanolin.	
Ocul. Fucithalmic 1 %	En salvsträng innanför nedre ögonlocket.	Kontaktlins ska ej användas under pågående behandling.	

Skia, pupilldilatation barn yngre än 1 år

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
K-droppar; Cyclopentolat 0,5 % + Fenylefrin 0,5%	1-2 droppar	Försiktighet med förstånds-handikappade och multihandikappade barn samt barn med hjärtbesvär.	

Skia, pupilldilatation barn äldre än 1 år

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
K-droppar;	1-2 droppar	Försiktighet med förstånds-	

Cyclopentolat 0,85 % + Fenylefrin 1,5%		handikappade och multihandikappade barn samt barn med hjärtbesvär.	

Tonusmätning, inspektion kornea

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
Ocg. Lidokain 4 % + Fluoroscein 0,25 %	1-2 droppar	Överkänslighet mot lidokain och andra lokalanestetika.	Ej med kontaktlins. Bedövningstid: 60 sek – 30 min.

Indocyaningrön angiografi – ICG

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
Inj. Indocyaningrön 25 mg	5 ml iv	Försiktighet vid allergi/ överkänslighet mot jod Hypertyreodism. Autonoma sköldkörtel-adenom.	

Fluoresceinangiografi – FAG

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
Inj. Fluorescite 10 %	2,5 ml iv	Överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Försiktighet vid allergi, amning och behandling med betablockerare.	

Vid oro inför operation/behandling

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
Lösning Midazolam 1mg/ml	2 ml p.o.	Känd överkänslighet mot benzodiazepiner, svår andnings-insufficiens. Försiktighet vid kronisk sjukdom.	

Värk

Läkemedel	Dosering	Kontraindikation/Varning	Anmärkningar
T. Alvedon 500 mg	1-2 tabletter	Försiktighet vid leversjukdom hjärt- eller njursvikt.	
T. Ibumetin 200 mg	1-2 tabletter	Försiktighet vid magbesvär och vid samtidig användning	

		av NSAID preparat.	

Uppdaterat från föregående version

Årsuppdatering: 250414 Nytt uppdaterat datum/bkn
Godkänd av MLA för nypublicering, uppdaterad Mall pga uteblivna uppgifter / 240806 MBN
Årsuppdatering.2023-11-14 redigerat text/bkn