

**OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.**

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Privata ögonmottagningar;  
Ögonkliniken Hallands sjukhus

## Barn-Retinopathy of Prematurity (ROP) – Screening

---

### Hitta i dokumentet

<a href="#">Remiss.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Remisskriterier .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Screening av ROP.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Första screening-undersökningen.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Uppdaterat från föregående version .....</a>	<a href="#">2</a>

---

### BARNÖGON Riktlinjer för screening och behandling av prematuritetsretinopati (ROP)

Nedanstående är ett utdrag av nationella riktlinjer med focus på remissbedömning.

[Länk till Nationella riktlinjer ROP | Swedrop](#)

### Remiss

Remiss för ROP-screening till Ögonmottagning bör skrivas av neonatolog inom en vecka efter födelsen.

Vid överflyttning av barn mellan neonatalavdelningar skall remiss skrivas till den lokala ögonkliniken direkt då barnet ankommer.

Ögonklinikerna skall ta kontakt med varandra om barn som påbörjat screening på en klinik överflyttas till annat sjukhus.

### Remisskriterier

För ROP-screening: gestationsålder (GÅ) <30 veckor (dvs  $\leq 29+6$  dagar). Endast om GÅ är okänd remitteras barn med födelsevikt <1500g. Utöver detta rekommenderas neonatologer också att remittera äldre och mycket svårt sjuka barn såsom tex barn med långdragen syrgasexposition.

### Screening av ROP

Vårdriktlinje: Barn-Retinopathy of Prematurity (ROP) – screening  
RH-14379

Fastställd av: Verksamhetschef, Fastställt: 2025-02-24

Huvudförfattare: Mastrok Farah PVG

Medförfattare:

Sida 1 av 2

## **OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.**

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Privata ögonmottagningar;  
Ögonkliniken Hallands sjukhus

Ögonundersökning görs av erfaren barnögonläkare vid respektive sjukhus.

### **Första screening-undersökningen**

Barn födda med GÅ < 26 veckor (25+6 dagar) undersöks vid en postmenstruell ålder (PMÅ) av 31 veckor.

Barn födda med GÅ > 26+0 veckor undersöks vid 6 veckors levnadsålder (postnatal ålder, PNÅ)

#### **Uppdaterat från föregående version**

Uppdaterad:

250224 uppdatering/Bkn

2020-05-07/bkn