

Katarakt – antibiotikabehandling i samband med kataraktoperation.

Hitta i dokumentet

[Antibiotikabehandling i samband med kataraktoperation](#)
[Blandningsschema finns på operationsavdelningen.](#)

[Förslag på granskare](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Antibiotikabehandling i samband med kataraktoperation

Standardbehandling:	Cefuroxim intrakameralt
Bilateral kataraktoperation:	Cefuroxim och Doktacillin intrakameralt
”Sista ögat”:	Cefuroxim och Doktacillin intrakameralt
Penicillinallergi med andningspåverkan, svullnad i ansikte o mun:	Vancomycin intrakameralt
Penicillinreaktion med klåda, utslag, ej allmänpåverkan:	Cefuroxim intrakameralt
MRSA-bärare:	Vancomycin intrakameralt

Blandningsschema finns på operationsavdelningen.

Odling före kataraktoperation endast vid kronisk kladdig konjunktivit, framför allt kopplat till tårvägsstenos där förbehandling med antibiotika ges efter odlingsvar.

Övriga "hudpatienter" med ex stomi, blefarit, immunosupprimerade m.m. ges ingen profylax.

Ovanstående är rekommendationer från S:t Eriks ögonsjukhus, överläkare Per Montan. Kataraktkirurgen gör sin egen bedömning i varje fall. Själv ger jag Kloramfenikol alternativt Fucithalamic preoperativt på förberedelserummet inför operation i tveksamma fall.

Förslag på granskare

Författare: Joanna von Hofsten, överläkare

Granskare: Anna Dahlgren, överläkare

Fastställare: Minna Idoffsson, verksamhetschef

Uppdaterat från föregående version

20200513: Rutin lagd i rätt mall/bkn