

Katarakt – inför narkos av ögonpatienter med diabetes

Hitta i dokumentet

[Rutin inför narkos av ögonpatienter med diabetes](#)

[Patienter med tablettbehandling](#)

[Patienter med insulinbehandling](#)

[Patienter med tablett- och insulinbehandling](#)

[Förslag på granskare](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Rutin inför narkos av ögonpatienter med diabetes

Gäller vuxna som opereras på ögonoperationsavdelningen

Patienter med tablettbehandling

- Inga diabetestabletter operationsdagen
- Vid ankomst till ögonoperationsavdelningen – tag kapillärprov och kontrollera b- glukos
- Sätt ett dropp med 1000 ml 5% Glukos (50 mg/l) med droppräknare inställd på 12 tim
- Om b-glukos är < 5 mmol/l eller > 10 mmol/l – kontakta narkos tel 343 50 till C-op och fråga efter den narkosläkare som har ansvar för ögonoperation. Sök sedan denne och fråga hur ni ska göra.

Patienter med insulinbehandling

- Inget insulin tas på morgonen operationsdagen
- Tag kapillärprov och kontrollera b-glukos när patienten kommer till ögonoperationsavdelningen
- Räkna samman antal enheter insulin/dygn patienten tar, alltså både kort- och långverkande ex Actrapid, Insulatard, Novomix, Lantus. Antal enheter delas med 2. Actrapid med denna halva mängd enheter tillsätts 1000 ml 10% Glukos

(100mg/ml) och lapp klistras på infusionpåsen där mängd Actrapid tillsatt anges. Droppräknare inställd på 12 tim. Om patientens sammanlagda enheter insulin/dygn understiger 30 E ska droppet ändå innehålla 15 E, alltså tillsätt aldrig mindre än 15 E Actrapid till droppet.

- Om b-glukos är < 5 mmol/l eller > 10 mmol/l – kontakta narkos tel 343 50 till C-op och fråga efter den narkosläkare som har ansvar för ögonoperation. Sök sedan denne och fråga hur ni ska göra.

Blodprovtagning sker med apparat som finns på jourrummet på ögonmottagningen. Denna kontrolleras med jämna mellanrum av personal på ögonmottagningen

Droppräknare lånas av avd 82. Actrapid samt droppåsar hämtas på avd 82.

På hemsidan för anestesi finns utförliga instruktioner angående narkos och diabetes.

Patienter med tablett- och insulinbehandling

Ingen tablett operationsdagen. Hantera insulinet som vid "Patienter med insulinbehandling".

Uppdaterat från föregående version

20231114/tagit bort ansvariga./Bkn

20200513: Inlagd i mall från original på G-katalogen till Joanna för granskning innan granskning av Anna /bkn.