

# KORNEA - Kornealtransplanterad - kontroller

---

## Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)

[Återbesök 2 \(7-10 dagar\)](#)

[Återbesök 3 \(cirka 1 mån\)](#)

[Återbesök 4 \(cirka 3 mån\)](#)

[Återbesök 5 \(1 år\)](#)

[Återbesök 6 \(18-24 mån\)](#)

[Återbesök 7 \(<=2 mån efter suturtagning  
optikerbesök\)](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Sammanfattning

Korneakirurger runt om i landet har lite olika rutiner kring den postoperativa uppföljningen och hänsyn bör tas till detta. Ofta får patienten skriftlig postoperativ information om droppregim och begär alltid journalkopior om dessa inte finns på plats.

### Återbesök 2 (7-10 dagar)

Patienten har oftast denna kontroll hos opererande kornealkirurg.

*Kontrollera:* Läkt epitel? Tät transplantatfog (fluoresceinfärgning)? Inre retning? Främre kammardjup? Tonus?

*Ordination:* Kortisondroppar x 4. Vid läkt epitel kan man ge patienten någon vecka till med antibiotikasalva.

### Återbesök 3 (cirka 1 mån)

*Kontrollera:* Visus. Läkt epitel? Klart transplantat? Sutur (lagom sträckt)? Tonus? Ögonbotten, överväg makulaOCT.

*Ordination:* Kortisondroppar sänks till x 3 i 1 månad därefter x 2 till nästa återbesök.

### Återbesök 4 (cirka 3 mån)

*Kontrollera:* Visus. Tonus. Klart transplantat? Friskt epitel? Sutur intakt och lagom sträckt? Kärlinväxt? Ögonbotten utan anmärkning?

*Ordination:* Kortisondroppar x 1-2 ytterligare 3 månader, sluta sedan om okomplicerat fall. Vid riskdiagnoser (retransplantation, tidigare trauma) kan man behöva fortsätta med kortisonbehandling, ibland livet ut.

### Återbesök 5 (1 år)

*Kontrollera:* Pentacam, autorefraktor och visus och tonus. Klart transplantat? Suturer sträckta (finns kärlinväxt, fibros?). Ögonbotten.

### Återbesök 6 (18-24 mån)

*Kontrollera:* Pentacam, autorefraktor, visus och tonus. Transplantat klart? Suturer sträckta? Ögonbotten.

Suturer kan tas (av kornealäkare eller kataraktkirurg med korneaerfarenhet)

*Ordination:* Efter suturtagning bör man ge Dexametason (Maxidex, Dexafree, Opnol) x 2 i 2 veckor, Chloromycetin-salva x 3 i 5 dagar.

### **Återbesök 7 (<=2 mån efter suturtagning optikerbesök)**

Pentacam och refraktionering, visus hos optiker. Om astigmatismen efter suturtag visar sig vara >4 D, bedömning hos läkare om avlastande incisioner kan behövas.

Två år efter transplantationen skall refraktionering redovisas samt tonus och bedömning om transplantatet är klart. Detta kan göras i samband med optikerbesök.

### **Dokumentägare**

Författare: Joanna von Hofsten, överläkare

Granskare: Anna Dahlgren, överläkare

Fastställare: Verksamhetschef

### **Relaterade länkar**

Länk 1:

Länk 2:

### **Uppdaterat från föregående version**

191023: Uppdaterat namn enl namnstandard, författare, granskare och fastställare för dokumentet samt relaterade länkar/bkn916