

## Läkemedel: Beredning av Doktacillin vid ögonoperation

---

### Hitta i dokumentet

#### [Tag fram](#)

[Beredning stamlösning 100 mg/ml:](#)

[Beredning av stamlösning 10 mg/ml:](#)

[Beredning av injektionslösning 1 mg/ml](#)

#### [Länkar:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

### Tag fram

1 st. ampull Doktacillin 1 g (=1000mg )

2 st. Natriumklorid 50 ml

2 st. Minispik

1 st. 10 ml spruta

1 st. 5 ml spruta

1st gula kanyler

2 st. etiketter

### Beredning stamlösning 100 mg/ml:

Sätt en Minispik i en flaska med Natriumklorid

Drag upp 10 ml Natriumklorid och blanda med Doktacillin torrsubstans 1g.

Lös väl.

### Beredning av stamlösning 10 mg/ml:

Ytterligare 4 ml dras upp ur samma flaska med Natriumklorid, kassera. Det finns nu 36 ml Natriumklorid kvar.

Drag upp 4 ml Doktacillin (= 400 mg) och spruta ner i glasflaskan innehållande 36 ml Natriumklorid. Det finns nu 40 ml stamlösning med styrkan 10 mg/ml

Märk flaskan Doktacillin 10 mg/ml

## **Beredning av injektionslösning 1 mg/ml**

Sätt en minispika i en ny flaska med Natriumklorid

Drag upp 5ml NaCl och kassera.

Drag upp 5 ml Doktacillin 10 mg/ml (= 50 mg) och spruta ner i flaskan med NaCl.  
Det finns nu 50 ml injektionslösning Doktacillin med styrkan 1 mg/ml.

## **Märk flaskan Doktacillin 1 mg/ml samt klockslag**

Förvaras kallt. Hållbart 5 timmar.

Vid operation injiceras 0,1 ml av injektionslösning Doktacillin 1 mg/ml intrakameralt

Författare: Lisbeth Johnsson, LMA - ögonsjuksköterska

Granskare: Anna Dahlgren, LMA - överläkare

Fastställare: Minna Idoffsson, verksamhetschef

**Länkar:** (till vårdriktlinje som har med denna att göra?)

### **Uppdaterat från föregående version**

210310: Inlagd i mall för vårdriktlinje/Bkn