OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.
Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

Region Halland

Gäller för: Privata Vårdgivare; Ögonkliniken
Hallands sjukhus

Läkemedel: Buffring av Xylocain-Adrenalin (10mg/ml + 5 mikrog/ml) med Tribonat vid infiltrationsanestesi

---

Bakgrund
Vid operationer som utförs i lokal anestesi med Xylokain-Adrenalin finns möjligheten enligt studier att reducera patientens smärta vid infiltrationen genom att buffra läkemedlet, dvs ändra pH-värdet

Ansvar
Instruktionen gäller operationsavdelningens operations/ögonsjuksköterskor.

Instruktion
Ta fram:

. 1 st Tribonat 100 ml
. 1 st Xylocain-Adrenalin (10mg/ml + 5 mikrog/ml) 20 ml
. 2st 2 ml spruta
. 2 st Mini-Spike Plus

Sprita av gummimembranen på Tribonat och Xylocain-Adrenalin innan MiniSpike sätts i flaskorna.

Drag upp 2 ml ur flaskan med Xylocain-Adrenalin och kassera i behållaren för läkemedelsdestruktion.

Drag sedan upp 2 ml Tribonat med ny spruta och spruta ned i flaskan med Xylocain-Adrenalin.

Märk flaskan med etikett att den är buffrad med 2ml Tribonat, datum , klockslag samt signatur

Flaskorna förvaras i rumstemperatur. Buffrad lösning är hållbar 24 timmar.

Uppdaterat från föregående version
260824: Vårdriktlinjen godkänd för publicering enl Sabina Tandrup./bkn
251127: Lagd till Åke för genomgång ev borttag./bkn

250414: Uppdaterat datum/bkn
210310: Rutin lagd i rätt mall/bkn