

# Läkemedel - Gilenya (fingolimod)

---

## Hitta i dokumentet

[Bakgrund](#)  
[Ögonundersökningar](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Bakgrund

Gilenya är ett selektivt immunohämmande läkemedel som ges vid MS. Makulaödem med eller utan synsymtom har rapporterats hos 0,5 % av patienterna och uppträder vanligen under de första 3-4 behandlingsmånaderna. Risken är högre (16 %) om patienten tidigare haft uveit. (FASS)

## Ögonundersökningar

Remiss inkommer från neurolog.  
Patienten skall undersökas 3-4 månader efter påbörjad behandling.

Undersökning: OCT av makula.

Undersökare: Sköterska som själv bedömer OCT.

Om normal bild ges information till patienten och avsluta.

Om misstänkt ödem: Till avdelningsläkare – komma och prata direkt (alt. JO20) för bedömning. Kontakt med patient och neurolog för att tillsammans avgöra om det är lämpligt med fortsatt behandling.

Författare: Anna Dahlgren, Överläkare

Granskare: Anna Dahlgren, Överläkare

Fastställare: Minna Idoffsson, Verksamhetschef

## Uppdaterat från föregående version

200421 - /Anna Dahlgren