Läkemedel: Infektionsfrofylax med Cefuroxim intrakameralt

Hitta i dokumentet

Spädningsinstruktioner:
Användning:
Uppdaterat från föregående version

Spädningsinstruktioner:

. Cefuroxim 250 mg

· NaCl 9 mg/ml injektionslösning 50 ml glasflaska med membran

· 10 ml spruta

· Minispike 2 stycken

· Använd skyddshandskar. Utför beredningen på ett absorberande underlag. Torka omedelbart upp eventuellt spill och torka av med tvållösning och Dags Ytdesinfektion

· Sätt en minispike vardera NaCl och Cefuroxim flaskan.

· Drag upp 30 ml NaCl och kassera.

· Drag upp 3 ml NaCl och spruta ner i ampullen med Cefuroxim. Löses väl. Behåll sprutan i Cefuroxim ampullen.

· När det är löst dra tillbaka lösningen i sprutan och spruta ner i kvarvarande 20 ml NaCl.

Man har nu 20 ml Cefuroximlösning 12,5 mg/ml.
Märk lösningen med datum och klockslag.
Hållbart 5 timmar i rumstemperatur.

Användning:

Vid uppdukning till kataraktoperation: Drag sterilt upp med en 5 ml spruta Luerlockfattning 1ml av Cefuroximlösningen. Blanda med 4 ml BSS. Totalt 5 ml Cefuroximlösning 2,5 mg/ml. Märk sprutan

Uppdaterat från föregående version

250414: Uppdatering av datum/bkn
210310: Lagd i rätt mall för vårdriktlinjer/bkn