

# Läkemedel: Infektionsprofylax med Cefuroxim intrakameralt

---

## Hitta i dokumentet

[Spädningsinstruktioner:](#)

[Användning:](#)

[Länkar:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Spädningsinstruktioner:

- Cefuroxim 250 mg
- NaCl 9 mg/ml injektionslösning 50 ml glasflaska med membran
- 10 ml spruta
- Minispik 2 stycken
- Använd skyddshandskar. Utför beredningen på ett absorberande underlag. Torka omedelbart upp eventuellt spill och torka av med tvållösning och Dags Ytdeinfektion
- Sätt en minispik vardera NaCl och Cefuroxim flaskan.
- Drag upp 30 ml NaCl och kassera.
- Drag upp 3 ml NaCl och spruta ner i ampullen med Cefuroxim. Löses väl. Behåll sprutan i Cefuroxim ampullen.
- När det är löst dra tillbaka lösningen i sprutan och spruta ner i kvarvarande 20 ml NaCl.

Man har nu 20 ml Cefuroximplösning 12,5 mg/ml.

Märk lösningen med datum och klockslag.

Hållbart 5 timmar i rumstemperatur.

## Användning:

Vid uppdukning till kataraktoperation: Drag sterilt upp med en 5 ml spruta  
Luerlockfattning 1ml av Cefuroximlösningen. Blanda med 4 ml BSS. Totalt 5 ml  
Cefuroximlösning 2,5 mg/ml. Märk sprutan

Författare: Lisbeth Johnsson, LMA - ögonsjuksköterska  
Granskare: Anna Dahlgren, LMA - överläkare  
Fastställare: Minna Idoffsson, verksamhetschef

**Länkar:**

(Länkar till vårdriktlinje/er?)

**Uppdaterat från föregående version**

210310: Lagd i rätt mall för vårdriktlinjer/bkn