

Läkemedel: Spädningsinstruktion för Vigamox 0,2 mg intrakameralt

Hitta i dokumentet

[Ta fram](#)
[Länkar:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Spädningsinstruktion för Vigamox 0,2 mg intrakameralt

Ta fram

- Spruta 3 ml
- Uppdragningskanyl
- Överföringskanyl MiniSpike 2 stycken
- Natriumklorid 9 mg/ml 10 ml plastampull för injektion 2 stycken
- Vigamox 5 mg/ml ögondroppe, lösning 5 ml

Sprita och bryt av halsen på en ampull med Natriumklorid och sätt i en MiniSpike.

Drag upp 2 ml Natriumklorid och kassera.

Det finns nu 8 ml Natriumklorid. Gör likadant med den andra ampullen.

Skruva av korken på droppflaskan med Vigamox. Dra upp 2 ml Vigamox och spruta ner i en av ampullerna med 8 ml Natriumklorid. Koncentrationen är nu Vigamox 1 mg/ml.

Märk ampullen med styrka, klockslag och signatur.

Gör på samma sätt med den andra ampullen

Kassera droppflaskan med Vigamox och ställ en av de beredda lösningarna i kylskåpet

Patienten ska få 0,2 ml av injektionslösningen Vigamox 1 mg/ml vilket motsvarar 0,2 mg

Spädningen är hållbar 5 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp

OBS! Om plastampullen läcker kasseras den och ersätts av en ny

Författare: Lisbeth Johnsson, LMA - ögonsjuksköterska
Granskare: Anna Dahlgren, LMA - överläkare
Fastställare: Minna Idoffsson, verksamhetschef

Länkar:

(länkar till vårdriktlinje/er?)

Uppdaterat från föregående version

210310: Rutin lagd i mall för vårdriktlinje/bkn