

Läkemedel: Spädning av Vancomycin

Hitta i dokumentet

[Spädningsinstruktioner för Vancomycin](#)
[Vid intravitreal injektion](#)
[Vid subkonjunktival injektion](#)

[Länkar:](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Spädningsinstruktioner för Vancomycin

Vancomycin 500 mg
Sterilt vatten 10 ml
Natriumklorid 9 mg/ml 10ml
Minispik 2 st
10 ml spruta
5 ml spruta
Gul kanyl

Sätt en minispik i torrampullen med Vancomycin

Dra upp 10 ml sterilt vatten och spruta ner i ampullen med Vancomycin.
Lös väl

Märk lösningen Vancomycin 50mg/ml

Sätt en Minispik i ampullen med NaCl
Drag upp 6 ml NaCl och kassera
Kvar i ampullen är nu 4ml NaCl

Tag 1 ml av lösningen Vancomycin 50 mg/ml och spruta ner i NaCl ampullen.

Det finns nu 5 ml Vancomycin 10 mg/ml.

Märk lösningen Vancomycin 10 mg/ml

Vid intravitreal injektion

ges 0,1 ml av lösningen 10 mg/ml = 1 mg

Vid subkonjunktival injektion

ges 0,5 ml av lösningen 50 mg/ml = 25 mg

Författare: Lisbeth Johnsson, LMA - ögonsjuksköterska
Granskare: Anna Dahlgren, LMA - överläkare

Fastställare: Minna Idoffsson, verksamhetschef

Länkar:

(Länkar till vårdriktlinje/er?)

Uppdaterat från föregående version

210310: rutinen lagd i rätt mall för vårdriktlinje/Bkn