

# Läkemedel: Spädning av Vancomycin

---

## Hitta i dokumentet

[Spädningsinstruktioner för Vancomycin](#)  
[Vid intravitreal injektion](#)  
[Vid subkonjunktival injektion](#)

[Länkar:](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Spädningsinstruktioner för Vancomycin

Vancomycin 500 mg  
Sterilt vatten 10 ml  
Natriumklorid 9 mg/ml 10ml  
Minispik 2 st  
10 ml spruta  
5 ml spruta  
Gul kanyl

Sätt en minispik i torrampullen med Vancomycin

Dra upp 10 ml sterilt vatten och spruta ner i ampullen med Vancomycin.  
Lös väl

### **Märk lösningen Vancomycin 50mg/ml**

Sätt en Minispik i ampullen med NaCl  
Drag upp 6 ml NaCl och kassera  
Kvar i ampullen är nu 4ml NaCl

Tag 1 ml av lösningen Vancomycin 50 mg/ml och spruta ner i NaCl ampullen.

Det finns nu 5 ml Vancomycin 10 mg/ml.

### **Märk lösningen Vancomycin 10 mg/ml**

#### **Vid intravitreal injektion**

ges 0,1 ml av lösningen 10 mg/ml = 1 mg

#### **Vid subkonjunktival injektion**

ges 0,5 ml av lösningen 50 mg/ml = 25 mg

Författare: Lisbeth Johnsson, LMA - ögonsjuksköterska  
Granskare: Anna Dahlgren, LMA - överläkare

Fastställare: Minna Idoffsson, verksamhetschef

**Länkar:**

(Länkar till vårdriktlinje/er?)

**Uppdaterat från föregående version**

210310: rutinen lagd i rätt mall för vårdriktlinje/Bkn