

Läkemedel: Spädningsinstruktion för Gentamicin

Hitta i dokumentet

[Spädningsinstruktion för Gentamicin](#)
[Länkar:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Spädningsinstruktion för Gentamicin

- Gentamicin 40 mg/ ml
- Ampull Natriumklorid 9 mg/ml 10 ml
- Minispik
- Spruta 1 ml

Sätt en minispik i ampullen med NaCl

Drag upp 0,25 ml och kassera

Drag upp 0,25 ml Gentamicin 40 mg/ml och spruta ner i ampullen med NaCl.

Det finns nu 10 ml Gentamicin med styrkan 1 mg/ml.

Märk ampullen med Gentamicin 1 mg/ml

Av denna lösning ges 0,1 ml = 0,1 mg intravitreal.

Vid subkonjunktival injektion ges 0,5 ml av Gentamicin 40 mg/ ml

Författare: Lisbeth Johnsson, LMA - ögonsjuksköterska

Granskare: Anna Dahlgren, LMA - överläkare

Fastställare: Minna Idoffsson, verksamhetschef

Länkar:

(länka till vårdriktlinje/er?)

Uppdaterat från föregående version

210310: Lagt rutinen i mall för vårdriktlinje/bkn