

Läkemedel: Spädningsinstruktion för Cymevene för intravitreal injektion

Hitta i dokumentet

[Tag fram](#)
[Tillvägagångssätt](#)
[Länkar:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Spädningsinstruktion för Cymevene för intravitreal injektion

Tag fram

- 1 st. Cymevene 500 mg
- 1 st. Sterilt vatten 10 ml plastampull
- 1 st. 10 ml spruta
- 1 st. Mini-Spike Plus (Filter)
- 1 st. gul kanyl

Tillvägagångssätt

- Sprita av halsen på plastampullen innehållande Sterilt vatten
- Sätt en Mini-Spike i ampullen med Cymevene
- Dra upp 10 ml Sterilt vatten ur plastampullen och spruta ned i ampullen med Cymevene. Koncentrationen blir 50 mg/ml
- Märk flaskan med läkemedlets namn, styrka, datum och signatur.
- Sterilklädd sjuksköterska drar upp 0,1 ml i en 1 ml spruta.
- Patienten ska erhålla 0,04 ml av injektionslösningen 50 mg/ml, vilket motsvarar 2 mg

Lösningen är hållbar 12 timmar i rumstemperatur

Författare: Lisbeth Johnsson, LMA - ögonsjuksköterska
Granskare: Anna Dahlgren, LMA - överläkare
Fastställare: Minna Idoffsson, verksamhetschef

Länkar:

(länkar till vårdriktlinje/er?)

Uppdaterat från föregående version

210310: Rutin läggs in mall för vårdriktlinje/bkn