

## Läkemedel: Spädningsinstruktion för Fortum

---

### Hitta i dokumentet

[Spädningsinstruktion för Fortum](#)

[Vid intravitreal injektion](#)

[Vid subkonjunktival injektion](#)

[Länkar:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

### Spädningsinstruktion för Fortum

Minispika 2 st

1 ampull Fortum torrs substans 500 mg

1 ampull Natriumklorid 9 mg/ml 20 ml

10 ml spruta

Sätt en Minispika i ampullen med NaCl samt en i flaskan med Fortum

Drag upp 5 ml NaCl och spruta ner i Fortum torrs substans.

Lös väl.

#### Märk flaskan med Fortum 100 mg/ml

Drag upp ytterligare 7 ml NaCl och kassera.

Kvar i ampullen är nu 8 ml NaCl

Drag upp 2ml Fortum 100 mg/ml och spruta ner i ampullen med NaCl

Det finns nu 10 ml Fortum 20 mg/ml

#### Märk lösningen Fortum 20mg/ml

#### Vid intravitreal injektion

ges 0,1 ml av lösning 20 mg/ml = 2 mg

#### Vid subkonjunktival injektion

ges 1 ml av lösning 100 mg/ml = 100 mg

Författare: Lisbeth Johnsson, LMA - ögonsjuksköterska

Granskare: Anna Dahlgren, LMA - överläkare

Fastställare: Minna Idoffsson, verksamhetschef

**Uppdaterat från föregående version**

240829:Uppdaterad mall, omgranskad av MLA, ny huvudförfattare.

210310: rutin inlagd i mall för vårdriktlinjer/bkn