OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.
Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

Region Halland

Gäller för: Privata ögonmottagningar;
Ögonkliniken Hallands sjukhus

PTOS

Hitta i dokumentet

Vanliga orsaker:
Mindre vanliga orsaker:
Symtom:
Kirurgisk behandling:

Vanliga orsaker:

Den vanligaste formen av de medfödda typerna orsakas av underutvecklad levator muskel. Den vanligaste formen av de förvärvade typerna orsakas av uttänjd eller avlossad levator aponeuros.

Mindre vanliga orsaker:

neurogena, mekaniska, traumatiska och pseudoptos.

Symtom:

Reversibel perifer synfältspåverkan, oftast i övre delen av synfältet. Patienten får ofta svårt vid läsning, då ptosen ökar vid blick nedåt.
Status:

1. Övre ögonlockskantens avstånd till korneal reflexen vid blick i primär possition.
2. Avstånd mellan övre och nedre ögonlockskant centralt på ögonlocket vid blick i primär position på långt håll.
3. Övre ögonlocks veckets avstånd från övre ögonlockskanten.
4. Levator funktion: Övre ögonlockskantens vandring i millimeter från blick nedåt till blick uppåt. Tryck över ögonbrynet för att hämma frontalis muskelns drag uppåt.
5. Kontrollera Bells fenomen
6. Utröttbarhet test för uteslutande av Myastenia Gravis
7. Torra ögon?

Kirurgisk behandling:

När ptosen orsakar övre synfältspåverkan eller svårigheter att läsa, bedöms att tillståndet ger funktions besvär och kirurgisk korrektion är indicerad.

261027: Genomgång av text samt nytt publiceringsdatum/bkn
231114 Reviderad tagit bort anvsvariga/bkn

Uppdaterad från föregående version 2020-04-21/bkn
Uppdaterat från föregående version 2020-03-25/bkn