

PTOS

Hitta i dokumentet

[Vanliga orsaker:](#)

[Mindre vanliga orsaker:](#)

[Symtom:](#)

[Kirurgisk behandling:](#)

[Förslag på granskare](#)

Vanliga orsaker:

Den vanligaste formen av de medfödda typerna orsakas av underutvecklad levator muskel. Den vanligaste formen av de förvärvade typerna orsakas av uttänjd eller avlossad levator aponeuros.

Mindre vanliga orsaker:

neurogena, mekaniska, traumatiska och pseudoptos.

Symtom:

Reversibel perifer synfältspåverkan, oftast i övre delen av synfältet. Patienten får ofta svårt vid läsning, då ptosen ökar vid blick nedåt.

Status:

1. Övre ögonlockskantens avstånd till korneal reflexen vid blick i primär position.
2. Avstånd mellan övre och nedre ögonlockskant centralt på ögonlocket vid blick i primär position på långt håll.
3. Övre ögonlocks veckets avstånd från övre ögonlockskanten.
4. Levator funktion: Övre ögonlockskantens vandring i millimeter från blick nedåt till blick uppåt. Tryck över ögonbrynet för att hämma frontalis muskelns drag uppåt.
5. Kontrollera Bells fenomen
6. Utröttbarhet test för uteslutande av Myastenia Gravis
7. Torra ögon?

Kirurgisk behandling:

När ptosen orsakar övre synfältspåverkan eller svårigheter att läsa, bedöms att tillståndet ger funktions besvär och kirurgisk korrektion är indicerad.

231114 Reviderad tagit bort ansvariga/bkn
Uppdaterad från föregående version 2020-04-21/bkn
Uppdaterat från föregående version 2020-03-25/bkn