

Provtagning och antiviral behandling av influensa och covid-19 på SÄBO och korttidsboende

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Bakgrund](#)
[Covid-19](#)
[Influensa](#)

[Flödesschema](#)
[Provhantering](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Praktisk hantering av luftvägsinfektioner hos riskgrupper på SÄBO och korttidsboenden i Halland.

Bakgrund

Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda sköra invånare från allvarlig sjukdom och död men hindrar inte alla att drabbas. Antiviral behandling i tidigt skede förkortar sjukdomsperioden, minskar smittsamheten och risken för komplikationer. Behandlingen kan även ges som profylax till riskgrupper efter känd exponering.

Baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendation [Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg](#) samt Läkemedelverkets [Behandling och profylax vid influensa – behandlingsrekommendation](#) har region Halland tagit fram två regionalt anpassade dokument:

- [Virusorsakade luftvägsinfektioner, Handläggning av misstänkta eller konstaterade, \(såsom covid-19, influensa och RS-virus\)](#)
- [Smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg](#)

Covid-19

Covid-19 är inte längre smittspårningspliktig men viktig att ha kontroll över för att förhindra eventuell smittspridning i känsliga miljöer. Behandling med Paxlovid övervägs om kriterier för detta är uppfyllt, se [Paxlovid i primärvård innefattande individer i kommunal hälso- och sjukvård](#). Diskussion med infektionsjour rekommenderas innan Paxlovid ordineras.

Influensa


Influensa hos sköra individer kan ge allvarliga infektioner som inte sällan kräver ineliggande vård. Det är av vikt att vid symtom på influensa sätta in tidig behandling, samt att vid konstaterad smitta även överväga profylaxbehandling till riskpersoner i patientens närmiljö.

Vid konstaterad influensa hos patient på SÄBO ska medicinskt ansvarig läkare för boendet kontaktas för ställningstagande till profylaxbehandling av exponerade. För stöd i utbrottsutredning kontaktas Vårdhygien. Under jourtid tas kontakt nästkommande vardag.

Sammanfattat

- Frikostig provtagning vid symtom på luftvägsinfektion hos riskpatient där exponering för andra i riskgrupp föreligger.
- Påbörja behandling mot influensa **innan provsvar anländer**. För dosering se [Terapirekommendationerna - Influensa](#). Notera njurfunktion!
- Om influensasvar är positivt - ta ställning till profylaxbehandling till exponerade.
- Om svar är negativ - *avsluta behandlingen*.

Flödesschema



Provhantering

För provtagning beställs COVPat (för patient). Proverna analyserar både covid-19 och influensa där kostnaden bärs centralt (exklusive arbete).

Analys av COVPat sker vanligtvis inte efter kl. 15.00 på vardagar, endast vid behov på lördagar och inte alls på söndagar. Då heller inte transport/logistik för prover finns under jourtid kommer provtagning uteslutande ske vardagar.

Om behov av provtagning ändå ses på jourtid behöver läkares, sjuksköterskas eller verksamhetschefs användar-ID (ex. ABC123) delges kommunsköterska då tidigare generella provkod för pandemimottagningen är inte längre aktiv.

Provtagning ska ske när det är adekvat, men beakta även det obehag som upprepad provtagning kan medföra.

I primärvården

Behandling, enligt terapirekommendationerna, ordineras av ansvarig läkare som också lägger upp erforderliga prover. Vid positivt influensasvar fortsätter behandlingen av patienten samt att ansvarig läkare får ta ställning till behov av profylaxbehandling enligt ovan. Vid negativt provsvar ansvarar läkaren för att meddela kommunsköterskan om avslut.

Ansvar för vårdcentralens hantering (ordination och kontroll av svar samt åtgärd) kan förstås läggas upp som verksamhetschefen önskar så länge som det är tydligt kommunicerat inom vårdenheten och att kommunsköterskorna är informerade.

På jourtid

Om individ i riskgrupp insjuknar på jourtid kontaktar kommunsköterska Beredskapsjouren för behandling/ordination. Prov tas enligt ovan vilket alltså ofta får vänta tills nästkommande vardag. Undantag kan göras efter Beredskapsjourens individuella bedömning. Observera att prov kan tas även efter att behandling påbörjats.

Om provsvar kommer under jourtid kan detta läsas i NPÖ, alternativt kan Beredskapsjouren kontaktas för besked. Vid positivt svar på influensa kontaktas Beredskapsjouren för ställningstagande till behov av profylax till exponerade. Vid negativa svar avslutas behandlingen.

Uppdaterat från föregående version

23- 12- 07 Ändrat rubrik för att definiera målgrupp, rättat uppgifter om NPÖ, analystider och jourtid. Lagt till flödesschema
2023-12-01 Ny rutin