

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

Provtagning och antiviral behandling av influensa och covid-19 på SÄBO och korttidsboende

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Bakgrund](#)
[Covid-19](#)
[Influensa](#)

[Flödesschema](#)
[Provhantering](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Praktisk hantering av luftvägsinfektioner hos riskgrupper på SÄBO och korttidsboenden i Halland.

Bakgrund

Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda sköra invånare från allvarlig sjukdom och död men hindrar inte alla att drabbas. Antiviral behandling i tidigt skede förkortar sjukdomsperioden, minskar smittsamheten och risken för komplikationer. Behandlingen kan även ges som profylax till riskgrupper efter känd exponering.

Baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendation [Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg](#) samt Läkemedelverkets [Behandling och profylax vid influensa – behandlingsrekommendation](#) har region Halland tagit fram två regionalt anpassade dokument:

- [Luftvägsinfektioner, Handläggning av misstänkta eller konstaterade, \(såsom covid-19, influensa, RS-virus och Mycoplasma pneumoniae\)](#)
- [Smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg](#)

Covid-19

Covid-19 är inte smittspåringspliktig men ändå viktig att ha kontroll över för att förhindra smittspridning i känsliga miljöer. Behandling med Paxlovid övervägs om kriterier för detta är uppfyllt, se [Paxlovid i primärvård innefattande individer i kommunal hälso- och sjukvård](#). Diskussion med infektionsjour rekommenderas innan Paxlovid ordinerar.

Influensa


Influensa hos sköra individer kan bli allvarlig och inte sällan kräva ineliggande vård. Det är därför av vikt att vid symtom på influensa sätta in behandling tidigt, samt att vid konstaterad smitta även ordinera profylaxbehandling till riskpersoner i patientens närmiljö.

Vid konstaterad influensa hos patient på SÄBO ska medicinskt ansvarig läkare för boendet kontaktas för profylaxbehandling av sköra exponerade boende. För stöd i utbrottsutredning kontaktas Vårdhygien. Under jourtid tas kontakt nästkommande vardag.

Sammanfattat

- Frikostig provtagning vid symptom på luftvägsinfektion hos riskpatient där exponering för andra i riskgrupp föreligger.
- Påbörja behandling mot influensa **innan provsvar anländer**. För dosering se [Terapirekommendationerna - Influensa](#). Notera njurfunktion!
- Om influensasvar är positivt - ta ställning till profylaxbehandling till exponerade.
- Om svar är negativ - avsluta behandlingen.

Flödesschema



Provhantering

För provtagning i Cosmic beställs provet "NPH I SARS-CoV-2 + Influensa A, B + RS I -". Sök på "SARS" så hittas det enklast. Proverna analyserar både covid-19, influensa och RS-virus där kostnaden för analysen bärs centralt.

Analys av provet sker alla veckans dagar och svar erhålls inom 24 timmar, dock ej söndagar. Begränsning i transport/logistik under jourtid gör att provhantering huvudsakligen sker på vardagar.

Vid behov av provtagning under jourtid kontaktas Beredskapsjouren.

Provtagning ska förstås ske när det är indicerat, men beakta även det obehag som upprepad provtagning kan medföra.

I primärvården

Behandling, enligt terapirekommendationerna, ordinerar av ansvarig läkare som också lägger upp erforderliga prover. Vid positivt influensasvar fortsätter behandlingen av patienten samt att ansvarig läkare får ta ställning till behov av profylaxbehandling enligt ovan. Vid negativt provsvar ansvarar läkaren för att meddela kommunsköterskan om avslut.

Ansvar för vårdcentralens hantering (ordination och kontroll av svar samt åtgärd) kan förstås läggas upp som verksamhetschefen önskar så länge som det är tydligt kommunicerat inom vårdenheten och att kommunsköterskorna är informerade.

På jourtid

Om individ i riskgrupp insjuknar på jourtid kontaktar kommunsköterska Beredskapsjouren för provtagning och behandling/ordination. Prov tas enligt ovan vilket man praktiskt kan behöva vänta med tills nästkommande vardag. Undantag kan göras efter Beredskapsjourens individuella bedömning.

Observera att prov kan tas även efter att behandling påbörjats.

Om provsvar kommer under jourtid kan detta läsas i NPÖ, alternativt kan Beredskapsjouren kontaktas för besked. Vid positivt svar på influensa kontaktas Beredskapsjouren för ställningstagande till behov av profylax till exponerade.

Vid negativa svar avslutas behandlingen.

Uppdaterat från föregående version

25-11-27 Uppdaterat efter byte av journalsystem