

09 18 24 Hjälpmedel för tarmsköljning

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)

[Mål med hjälpmedel](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Här ingår t.ex. produkter för sköljning av tarmarna via en stomi eller ändtarmen

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. läkare.
Leg. sjuksköterska.
Leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun.
Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.
Leg. barnmorska.
Dipl. uroterapeut.

Målgrupp

Barn från tre års ålder och vuxen med en rad olika tarmsymtom, inklusive de som har genomgått tarmkirurgi och som efter detta lider av lågt främre resektionssyndrom, så kallat LARS.

Kriterier

Behov av tarmsköljningshjälpmedel för att normalisera eller förbättra tarmtömningsmönster och minska avföringsläckage.

Mål med hjälpmedel

Förbättrat tarmtömningsmönster.

Råd i förskrivningsprocessen

Innan förskrivning ska patienten genomgått utredning för analinkontinens.

Initiering av TAI ordinerar av leg. läkare.
Utprovning, upplärning och behandlingsstrategi sker på behandlade enhet.

Uppdaterat från föregående version

Ingen ändring