Regional processbeskrivning för venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT)

Processbeskrivningen kan innehålla länkar till dokument som enbart rör verksamheter i Region Hallands egen regi

Region Halland

Egenvård*

Vid symtom med plötslig svullnad, rodnad, värk, ömhet, och/eller värmeökning i ben eller vad (som uppstår utan föregående trauma).

Patienten kontaktar vårdcentral eller jourcentral akut.

Patient och närståendeinformation Blodpropp i benet - 1177

*Egenvård är när patienten själv, eller med hjälp av någon annan, utför hälso- och sjukvårdsåtgärder utanför hälso- och sjukvården, läs mer här.

Närsjukvård

Läkare utreder misstänkt eller fastställd DVT enligt vårdriktlinje: Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) och vårdprogrammen:

Venös tromboembolism - rekommendationer för Södra sjukvårdsregionen

Venös tromboembolism och antikoagulantiabehandling hos vuxna och vid graviditet (vgregion)

Vid låg sannolikhet för DVT avslutas utredningen.

Vid okomplicerad DVT enligt vårdrktlinje: Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE)

Vid jourtid Ultraljud med DVT frågeställning Röntgen Halland

Remittent ansvarar för insättning av behandling enligt Terapirekommendationer: antikoagulantia och Venös tromboembolism

Vid komplicerad DVT fortsatt handläggning inom specialistvård.

Remiss

Remiss

Specialistvård

Röntgen

Efter undersökning blir patienten hänvisad till akutmottagningen eller hem

Akutmottagning

Akutläkare/medicinläkare ansvarar för den initiala handläggningen på akutmottagningen. DVT misstanke

Kvinnoklinikens läkarjour handlägger gravida kvinnor och 6 v post partum vid fastställd diagnos enligt vårdriktlinje Trombos och lungemboli – akut behandling under graviditet och puerperium (6 ve post partum) – KK HS, och Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE)

Inskrivna patienter i specialistvård:

Vid DVT misstanke ansvarar den klinik för utredning och behandling enligt vårdriktlinje: Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE)

Venös-tromboembolism – rekommendationer för södra sjukvårdregionen.

Venös tromboembolism och antikoagulantia-behandling hos vuxna och vid graviditet vgregion.se

Vid fastställd DVT med indikation för trombolys eller trombektomi.

Kvinnokliniken

Ansvarig läkare gör uppföljning enligt vårdriktlinje: Trombos och lungemboli – akut behandling under graviditet och puerperium (6 ve post partum) – KK HS

Remiss

Akut kontakt

Regionvård

Kärlkirurgi, Göteborg, SU alt. Kärlkirurgi, Malmö SUS

Kunskapsstöd

Riktlinjer för behandling av cancerassocierad venös tromboembolism (cVTE)

Djup ventrombos - 1177 för vårdpersonal

Patient- och närståendeinformation

Patient och närståendeinformation 1177 blodproppar

Andra relevanta länkar

Regional tillämpning av barnkonventionen

DVT-score Kalkylator

VAS - Remisser och remissvar

Detta är en processbeskrivning för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika vårdnivåer och berörda aktörer.
Regional processbeskrivning: Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT)
Fastställd av: Regional samordnande chefsläkare, Fastställd: 2024-10-03
Huvudförfattare: Marcus Lingman HS LEDN