

Förskrivning av spinala ortoser system 06 03 03 – 06 03 18

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)

[Bakgrund](#)

[SAKRO-ILIAKA ORTOSER \(SIO\)- 06 03 03](#)

[LUMBO-SAKRAL ORTOSER \(LSO\) - 06 03 06](#)

[THORAKO-LUMBO-SAKRAL ORTOSER](#)

[\(TLSO\) - 06 03 09](#)

[CERVIKAL ORTOSER \(CO\) - 06 03 12](#)

[CERVISTÖD](#)

[CERVIKO-THORAKALA ORTOSER \(CTO\) - 06 03 15](#)

[CERVIKO-THORAKO-LUMBO-SAKRAL ORTOSER \(CTLSO\) - 06 03 18](#)

[Förskrivningsanvisningar för kod 06 03 03 – 06 03 18](#)

[Indikationer för förskrivning](#)

[Egenavgift](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Syftet med denna rutin är att ge en tydlig och strukturerad vägledning för förskrivare av spinala ortoser såsom graviditetsgördlar, elastiska ortoser, thermoortoser, läder-plast-metall och tygkorsetter, sittortoser, extensionsortoser, fasta halskragar och halovästar.

Bakgrund

Koden **06 03 spinala ortoser system** refererar till en grupp av ortopediska hjälpmedel som är hjälpmedel designade för att stödja, stabilisera, avlasta eller korrigera problem i ryggraden (spinalsystemet). Dessa ortoser används för behandling av olika tillstånd som påverkar ryggens struktur eller funktion.

Klassificering av Spinala ortoser system (06 03)

SAKRO-ILIAKA ORTOSER (SIO)- 06 03 03

Omfattar hela eller del av bålens sakro-iliakala region.

LUMBO-SAKRAL ORTOSER (LSO) - 06 03 06

Omfattar hela eller del av bålens lumbala och sakroiliakala region.

THORAKO-LUMBO-SAKRAL ORTOSER (TLSO) - 06 03 09

Omfattar hela eller del av bålens thorakala, lumbala och sakro-iliakala region.

CERVIKAL ORTOSER (CO) - 06 03 12

Omfattar hela eller del av den cervikala regionen, inklusive atlanto-occipitalleden.

CERVISTÖD

Cervistöd förskrivs endast för att uppnå maximal arbetsställning för patienter med dålig huvudkontroll.

Innan förskrivning sker ska diskussion ske i behandlingsteamet.

CERVIKO-THORAKALA ORTOSER (CTO) - 06 03 15

Omfattar hela eller del av den cervikala och thorakala regionen, inklusive atlanto-occipitalleden.

CERVIKO-THORAKO-LUMBO-SAKRAL ORTOSER (CTLSO) - 06 03 18

Omfattar hela eller del av den cervikala, thorakala, lumbala och sakroilikala regionen, inklusive atlanto-occipitalleden.

Förskrivningsanvisningar för kod 06 03 03 – 06 03 18

Ortoser under koderna 06 03 03 – 06 03 18 kan förskrivas av läkare med specialistkompetens i ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering och överläkare verksam inom medicinsk habilitering.

Förskrivningsrätt och/eller uppföljning kan delegeras till annan befattningshavare av verksamhetschef och av överläkare vid medicinsk habilitering.

Indikationer för förskrivning

Ortoser inom dessa kategorier kan förskrivas för följande diagnoser och tillstånd:

- Fraktur/dislokation.
- Instabilitet orsakad av: reumatoid artrit, tumör kongenital missbildning samt efter kirurgi.
- Nackmuskelpares som vid polio eller muskel-dystrofier.
- Distorsion exempelvis efter whiplashvåld.
- Scolios hos växande individ, eller med neuromuskulär genes.
- Scheuerman hos växande individ.
- Spondylit, spondylolisthes pre- och postoperativt.
- Instabilitet orsakad av degeneration eller i samband med kirurgi.
- SI-leds instabilitet orsakad av trauma eller graviditet samt spinal stenosis.

Egenavgift

Beslutade egenavgifter framgår i [avgiftshandboken](#).

Uppdaterat från föregående version

Här kan man skriva en kort information om de viktigaste uppdateringarna.