

Manual Cosmic - ePed

Hitta i dokumentet

[Inledning](#)

[ePed - Förskriva med mall](#)

[ePed - Förskriva utan mall](#)

[ePed - Förskriva med formelbaserad mall](#)

[ePed - Förskriva paket med ePed](#)


[rimlighetskontroll](#)



[Uppdaterat från föregående version](#)

Inledning


ePed är ett erfarenhets- och evidensbaserat beslutsstöd för säker läkemedelshantering till barn. ePed rimlighetskontroll är en funktion i journalsystemet som varnar vid ordination av för höga eller för låga doser av vissa läkemedel, främst högriskmedel.

ePed - Förskriva med mall



1. Öppna fönstret **Läkemedel**.
2. Välj fliken **Ny**.
3. Sök efter en mall genom att skriva minst tre tecken i fältet **Fritextsök** och tryck på **ENTER**. (Ikonen  indikerar att den valda mallen ingår i rimlighetskontrollen.)
4. Välj en lämplig mall i listan. Informationen om **ePed** är **synlig till höger i fönstret**, i panelen ePed.
5. Ange patientens vikt i fältet **Vikt** eller markera kryssrutan för tidigare registrerad vikt (arketypp)¹
6. Håll musen över ikonen för att tool tip ska visas.
7. För att signera ordinationen klickar man på **Signera** eller **Signera och öppna listan**.
8. När en enskild dos eller dygnsdos är utanför intervallet, öppnas varningsdialogfönstret **Obligatoriska kommentarer**. Det är obligatoriskt att lägga till en kommentar eller att markera kryssrutan och då fylls texten **Saknar klinisk relevans** i detta fall i automatiskt.
9. Klicka på **OK**.
ePed-ikonen visas i flikarna **Läkemedelslista** och **Utdelningsvy** i presentationsläge **Stor** och i rubriken **Varningar**. Håll musen över ikonen för att läsa motiveringen.

¹Om den enskilda dosen och dygnsdosen är inom dosintervallet är ePed-ikonen grön  och om utanför, visas det i röd text och med en gul ePed-ikon  ..



ePed - Förskriva utan mall


1. Öppna fönstret **Läkemedel**.
2. Välj fliken **Ny**.
3. Sök efter produkten genom att skriva in minst tre tecken i fältet **Fritextsök** och tryck på **ENTER**. (Ikonen  indikerar att det valda läkemedlet ingår i ePed rimlighetskontroll.)
4. **Välj den produkt** som ska ordineras.
5. Klicka på **Ordinationsdetaljer**.
6. Fyll i **Ordinationsorsak** och **Dosering**.
7. Ange patientens vikt i fältet **Vikt** eller markera kryssrutan för tidigare registrerad vikt (arketypp)²

8. För att signera ordinationen, klicka på **Signera** eller **Signera och öppna listan**.
9. Om en enskild dos eller dygnsdos är utanför intervallet öppnas varningsdialogfönstret **Obligatoriska kommentarer**. Det är obligatoriskt att lägga till en kommentar eller att markera kryssrutan, varpå texten **Saknar klinisk relevans i detta** fall fylls i automatiskt.
10. Klicka på **OK**.
ePed-ikonen visas i flikarna **Läkemedelslista** och **Utdelningsvy** i presentationsläge **Stor** och i rubriken **Varningar**. Håll musen över ikonen för att läsa motiveringen.

²Om den enskilda dosen och dygnsdosen är inom dosintervallet, är ePed-ikonen grön 
Om den enskilda och/eller dygnsdosen är utanför intervallet, visas detta med röd text och med en gul ePed -ikon . ePed-ikonen visas i förhandsgranskningsområdet. Håll musen över ikonen för att tool tip ska visas.

ePed - Förskriva med formelbaserad mall

1. Öppna fönstret **Läkemedel**.
2. Välj fliken **Ny**.
3. Sök efter en mall genom att skriva minst tre bokstäver i fältet **Fritextsök** och tryck på **ENTER**. (Ikonen  indikerar att den valda mallen ingår i ePed rimlighetskontroll.)
4. Välj en formelbaserad mall³
5. Ange patientens vikt i fältet **Vikt** eller markera kryssrutan för tidigare registrerad vikt (arketyt).
6. Vid förskrivning med hjälp av en formelbaserad mall, är det också möjligt att öppna fliken **Ordinationsdetaljer** och ange patientens vikt.
7. I det här exemplet registreras vikten i fliken **Ny**. Klicka på knappen **Ordinationsdetaljer** för att ange doseringen. I dialogfönstret Kalkylering för visas den vikt som är registrerad i fliken **Ny**. (ePed-ikonen  indikerar att alla doser är inom intervallet.)
8. Om ingen vikt registreras i fliken **Ny** är det obligatoriskt att ange en vikt i det här steget. Ett **Värde att överföra** beräknas baserat på vikt och dosering per kg. Alternativet **Värde att överföra** beskriver den beräknade doseringen som kan överföras från **Doskalkylatorn** till ordinationen. Det är möjligt att ändra eller avrunda värdet om det behövs.
9. Om man vill signera ordinationen, klicka på **Signera** eller **Signera och öppna listan**.
ePed-ikonen visas i flikarna **Läkemedelslista** och **Utdelningsvy** i presentationsläge **Stor** och i rubriken **Varningar**. Håll musen över ikonen för att läsa motiveringen.

³Informationen i den valda mallen från rimlighetskontrollen visas till höger i fönstret.
ePed-ikonen är grå  i detta fall, eftersom den formelbaserade mallen inte har en dosering angiven. Detta visas i förhandsgranskningen.

ePed - Förskriva paket med ePed rimlighetskontroll

1. Öppna fönstret **Läkemedel**.
2. Välj fliken **Ny**.
3. I listrutan **Sök efter** välj alternativet 'Paket'.
4. Skriv minst tre tecken i fältet **Fritextsök** och tryck på **ENTER**.
5. Välj det paket som ska expanderas. Till höger i panelen **ePed** visas rimlighetskontrollen för varje specifik mall i paketet.
6. Ange patientens vikt i fältet **Vikt** eller markera kryssrutan för att välja en tidigare registrerad vikt (arketyt).

7. Kontrollera den enskilda dosen och dygnsdosen. Doser inom eller utanför intervallet indikeras med ePed-ikonen under mallnamnet. ePed-ikonen för paket visas ovanför viktkomponenten.⁴
8. Kontrollera utfallet i förhandsgranskningen om en eller flera ordinationer ska starta vid annan tidpunkt än för referenspunkten. (För valt paket visas det i fönstrets nedre. I listrutan **Referenspunkt** är standardalternativet 'Datum och tid'.)
9. Kontrollera att rätt vårdkontakt har valts och välj alternativknappen **Administreras på enhet** i panelen **Behandlingsinformation**.
10. Om paketet innehåller viktbaseade mallar klicka på knappen **Ordinationsdetaljer**. Mallarna för paketet visas nu i flera flikar och varje mall måste signeras. För information om hur du ordinerar med en formelbaserad mall, se avsnitt [Förskriva med formelbaserad mall](#)
11. Klicka på **Signera** eller **Signera och öppna listan**.
12. Om enskild dos eller dygnsdos ligger utanför dosintervallet öppnas varningsdialogfönstret **Obligatoriska kommentarer**. I detta, är det obligatoriskt att ange en kommentar eller att markera kryssrutan och då fylls texten **Saknar klinisk relevans** i detta fall i automatiskt.
13. Klicka på **OK**. Paketet visas nu som separata rader under rubriken **Aktuella läkemedelsbehandlingar**. ePed-ikonen visas i flikarna **Läkemedelslista** och **Utdelningsvy** i presentationsläge **Stor** och i rubriken **Varningar**. Håll musen över ikonen för att läsa motiveringen


4

 *Doser utanför intervallet. Texten visas i rött.*

Paket: *En eller flera doser utanför intervallet*

 *Alla doser är inom intervallet.*

Paket: *Alla doser i mallarna för förpackningen är inom dosintervallet.*

 *Viktbasead mall alternativt innehåller den en dosering eller administreringsväg som inte är tillgänglig för rimlighetskontroll.*

Paket: *Om mallarna för paketet har grå och gröna ikoner.*

Uppdaterat från föregående version

Ny manual