

Spädningsinstruktion för Vigamox 0,3 mg intrakameralt

Ta fram

- Spruta 3 ml
- Uppdragningskanyl
- Överföringskanyl MiniSpike 2 stycken
- Natriumklorid 9 mg/ml 10 ml plastampull för injektion 2 stycken
- Vigamox 5 mg/ml ögondroppe, lösning 5 ml

Sprita och bryt av halsen på en ampull med Natriumklorid och sätt i en MiniSpike. Drag upp 2 ml Natriumklorid och kassera. Det finns nu 8 ml Natriumklorid. Gör likadant med den andra ampullen

Skruva av korken på droppflaskan med Vigamox. Dra upp 2 ml Vigamox och spruta ner i en av ampullerna med 8 ml Natriumklorid. Koncentrationen är nu Vigamox 1 mg/ml. Märk ampullen med styrka, klockslag och signatur.

Gör på samma sätt med den andra ampullen

Kassera droppflaskan med Vigamox och ställ en av de beredda lösningarna i kylskåpet

Patienten ska få 0,3 ml av injektionslösningen Vigamox 1 mg/ml vilket motsvarar 0,3 mg

Spädningen är hållbar 5 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp

OBS! Om plastampullen läcker kasseras den och ersätts av en ny

Uppdaterad från föregående version

260204: Rättat i ingress/bkn

260126: 0,3 ml Vigamoxlösning ges istället för 0,2 ml. Detta i enlighet med ST: Eriks
ögonsjukhus, dr Per Montan.

210310: Rutin lagd i mall för vårdriktlinje/Bkn