

Rubrik

Hitta i dokumentet

[Utan kopp](#)[Med kopp](#)[Förslag på granskare](#)[Uppdaterat från föregående version](#)

Metod 1

Utan kopp

1-2 droppar oxibuprocaine, (första droppen kan ges i förberedelsen) sedan Providone jodin 5% 2-3 droppar. Vänta minst 1 min. Patienten sluter ögat och rör ögat i olika blickriktningar. Tvätta huden med klorhexidinsprit. Duk och blefarostat. Droppa sedan providone jodin över stickstället vänta 15-30 sekunder. Ge injektionen och droppa Oftagel/Viscotears avslutningsvis.

Vid allergi mot jod: använd klorhexidinlösning för att spola ögat som vid tidigare rutin.

Metod 2

Med kopp

1-2 droppar oxibuprocaine, (första droppen kan ges i förberedelsen) sedan Providone jodin 5% 2-3 droppar. Vänta minst 1 min. Patienten sluter ögat och rör ögat i olika blickriktningar. Tvätta huden med klorhexidinsprit. En droppe providone jodin över stickstället vänta 15-30 sekunder. Koppen läggs på och injektionen ges, droppar Oftagel/Viscotears avslutningsvis.

Förslag på granskare

Joanna von Hofsten, överläkare

Uppdaterat från föregående version

2025-09-22: Uppdatering av riktlinje i samråd med Joanna von Hofsten/bkn