

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Privata ögonmottagningar;
Ögonkliniken Hallands sjukhus

Kornea DSAEK och DMEK – postoperativ vård och uppföljning efter kornealtransplantation.

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)

[Bakgrund](#)

[Återbesök 1](#)

[Återbesök 2](#)

[Återbesök 3](#)

[Återbesök 4](#)

[Återbesök 5](#)

[Återbesök 6](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Korneakirurger runt om i landet har lite olika rutiner kring den postoperativa uppföljningen och hänsyn bör tas till detta. Patient får skriftlig postoperativ information om droppregim från opererande enhet, även dessa kan se lite olika ut beroende på var i landet de är opererade.

Bakgrund

Patient med hornhinnsvullnad eller och nedsatt synkvalitet p g a grund av dåligt hornhinneendotel kan behandlas med transplantation av det innersta skiktet av hornhinnan; endotelet och dess basalmembran (Descemets membran). DMEK är cirka en 100 delar mm, DSAEK är cirka en tiondels mm tjockt) Dessa tunna transplanterat sutureras inte utan trycks på plats mot hornhinnans insida med hjälp av en gasbubbla i främre kammaren, tills transplanteratet fäster vilket sker vanligen inom de första postoperativa dygna.

Återbesök 1 (dag 1) Sker vanligtvis på opererande enhet

Återbesök 2 (dag 7-10) Sker vanligtvis på opererande enhet.**Återbesök 3** (1 månad) Sker vanligtvis på opererande enhet.

Återbesök 4 (3 månader)

Kontrollera: Visus (enl AR/eggl), tonus (steroidrespons) OCT-makula (cystiskt makulaödem). Läkt epitel? Klart transplanterat, MD-veck? Ligger inre lamellen mot värdkornea? Ingen vätskespalt?, glipor? (här kan främre OCT hjälpa till). Värdkornea? Ta bort eventuella icke resorberbara suturer. Främre kammare oretad. Ögonbotten utan anmärkning.

Läkemedelsordination: Kortisondroppar enl nedtrappningsschema, ordinerat av operatören och detta kan variera beroende på kirurg och ort.

Informera patient: Repetera för patient att söka vård vid minsta symtom på avstöttningsreaktion som tex synnedsättning/dimsyn, ljuskänslighet, rodnad, smärta/skav. Symtomen kan komma successivt eller plötsligt.

DMEK: Kan skaffa nya glasögon efter 3 månader.

DSAEK: Kan skaffa nya glasögon efter 6 månader.

Återbesök 5 (1 år)

Kontrollera: Samma som vid återbesök 4/3 månaders kontroll.

Informera patient: Samma information som vid återbesök 4/3 månaders kontroll.

Återbesök 6 (2 år) Sker oftast hos opererande enhet. (Sker hos optiker ej läkarbesök). Endotelcellsmätning, kan vi inte utföra i Halland. Data till kornearegister.

Uppdaterat från föregående version

2026-06-23: Uppdatering av vårdriktlinje./Bkn