

Antibiotikaprofylax vid gynekologisk kirurgi – KK HS

Hitta i dokumentet

[Bakgrund](#)
[Ordnation](#)
[Allergi eller annan kontraindikation](#)

[Utvärdering](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Bakgrund

För att minska antalet postoperativa infektioner ges antibiotikaprofylax vid hysterektomi samt vid användning av implantat.

Endokarditprofylax ges inte längre vid gastrointestinala och urogenitala ingrepp.

Ordnation

Ordineras av gynläkare vid preop besök, inskrivning eller inför dagkirurgi.

1 tabl Bactrim Forte + 2 tabl Flagyl 400 mg ges minst 2 timmar innan ingreppets början. (kan ges även vid PC-allergi). Vid direktintag skickas detta med patienten hem i samband med inskrivningssamtalet och intages cirka 3 timmar innan patienten ska vara på op.

Inför:

- Hysterektomi abdominellt, vaginalt eller laparoskopiskt.
- Prolaps där det ingår hysterektomi, implantat eller kolposacropexi.
- Implantat såsom vid TVT, nät.
- Explorativ laparotomi pga tumör, ofta ingår hysterektomi.

Vid missad profylax eller utvidgad operation eller annan riskfaktor ges intravenöst antibiotika inom 2 timmar före operationsstart eller så tidigt som möjligt under operationen:

Infusion Eusaprim 2 ampuller á 5 ml (16 mg/ml Trimetoprim + 80 mg/ml Sulfametoxazol) späds med 250 ml fysiologisk koksaltlösning kombinerat med **Infusion Flagyl 1,5 g** (5 mg/ml Metronidazol) 300 ml i.v. Alternativt inf Piperacillin-tazobactam 4 g i.v.

Allergi eller annan kontraindikation

Vid kontraindikation mot **sulfa eller trimetoprim**:

- ersätts Bactrim ovan med: 2 tabl Doxyferm 100 mg
- ersätts Eusaprim samt även Flagyl ovan med Infusion Dalacin 600 mg i.v.(150 mg/ml Klindamycin, 4 ml i.v.)

Vid kontraindikation mot **metronidazol** ersätts bägge preparaten ovan med

- 1 kapsel Dalacin 300 mg eller
- Infusion Dalacin 600 mg i.v.(150 mg/ml Klindamycin, 4 ml i.v.)

Utvärdering

Uppföljning av postoperativa infektioner sker via Gynop-registret.

Uppdaterat från föregående version

Januari -23: Reviderad med nytt datum utan ändringar.

Jan -22: Reviderad med nytt datum utan ändringar.

21-02-10: Uppdaterad utan ändringar.

190417: tagit bort regional uppföljning. Lagt till alt inf Piperacillin-tazobactam under ordination. Gäller även för gyn Kba.

170616: Lagt till meningen om tabletter vid direktintag.

150331: Reviderad och gäller för både Halmstad och Varberg.

Varberg PM: **Antibiotikaproylax vid gynekologisk kirurgi**, 2013-11-15