

Blödning, smärta i tidig graviditet - KK HS

Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)
[Spontanabort och uteblivet missfall \(missed abortion\)](#)
[Extrauterin graviditet](#)

[Mola](#)
[Patientinformation](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Sammanfattning

Blödning i tidig graviditet är vanligt (25 % av alla gravida har blödning i första trimestern) och föranleder i de flesta fall ingen åtgärd. För den enskilde patienten kan det dock vara förenat med stor oro. En mindre blödning avstannar oftast inom ett par dagar. Det kan t.ex. bero på sköra slemhinnor och ökad genomblödning. Många får även en mindre blödning vid tidpunkten för när mens skulle varit.

Molande, mensliknande värk kan i många fall bero på att livmodern växer och ligamenten töjs.

Patienter som kan avvakta i hemmet:

Mindre blödning och eller molande, mensliknande värk.

Patienter som bör komma in akut:

Ensidig smärta i tidig graviditet. Kraftig blödning. Starka smärtor.

Patienter som bör komma in inom ett par dagar:

Större blödning som vid misstänkt missfall, där blödningarna inte lugnar ner sig. Upprepade blödningar/kontakt med telefonrådgivning. Kontaktblödningar (efter samlag eller träning).

Spontanabort och uteblivet missfall (missed abortion)

Länk till vårdriktlinje; [Abort spontan och uteblivet missfall](#)

Gravtest i hemmet rekommenderas efter 4 veckor. Ny kontakt vid positivt svar.

Har inte graviditeten verifierats med ultraljud kan man inte utesluta en extrauterin graviditet.

Extrauterin graviditet

Länk till vårdriktlinje; [Extrauterin graviditet](#)

Mola

Länk till vårdriktlinje; [Mola - KK HS](#)

Patientinformation

[Blödning under graviditet 1177.se](#)

Uppdaterat från föregående version

2024-12-05: Reviderad med nytt datum utan ändringar.

April-23: Reviderad med nytt datum utan ändringar.

Juni-21: Reviderad utan ändringar.

Jan-18: Ny vårdriktlinje. Ersätter **Telefonrådgivning vid blödningar eller smärta i tidig graviditet**.