

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus;
Privata gynekologimottagningar

Klamydia, provtagning och åtgärder vid positivt prov

Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)
[Provtagning](#)
[Handläggning vid positiv klamydiaodling](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Sammanfattning

Chlamydia trachomatis orsakar den sexuellt överförda sjukdom som kallas klamydia, som orsakar cervicit, uretrit och salpingit.

För utförlig information se riktlinje för Hudkliniken: [Handläggning av sexuellt överförbara infektioner \(klamydia, gonorré, syfilis\) - smittspårning, behandling, smittskyddsanmälan](#)

Provtagning

- Klamydiascreening utförs på alla som söker för avbrytande.
- Indicerad provtagning, dvs vid symptom (flytning, oklar feber, nedre buksmärta, blödningsrubbing eller UVI-symtom med negativ urinsticka och bakterieodling).
- Frikostig provtagning för övrigt.
- Odling från vagina. Provtagningspinnen roteras utmed vaginalväggen 15-30 sekunder. Stoppas därefter i transportröret och bryts av vid skåran.
- Alla klamydiaprover analyseras även för gonorré.

Handläggning vid positiv klamydiaodling

Remiss till UM eller STI-mott för både behandling och smittspårning: de gör även smittskyddsanmälan via Sminet

Skriv akut remiss

- 24 eller äldre: STI- mottagning Halmstad/Varberg (Remiss STI mottagning Halmstad/Varberg i Cosmic)
- Under 24 år: UM Remiss (Smittspår klamydia i Cosmic)

På remissen ska det framgå:

1. om patienten är informerad
2. var/hur patienten kan nås: aktuellt telefonnummer

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus;
Privata gynekologimottagningar

Informera patienten:

- Diagnos och rekommendera avhållsamhet tills behandling är avslutad
- Förhör dig om symtom på allvarlig sjukdom; feber, nedre buksmärta etc: akutbehandling enligt nedan?
- Info att STI-mott/UM inom kort kommer att ta kontakt för behandling
- Att de tar kontakt via 1177 eller tel som visas som 010-1848004
- Ge patienten [Klamydia - patientinformation](#), ev. som länk via 1177

Ett krav för att få remittera patienten till smittspårning är att behandling inte påbörjats.

Undantag gäller vid svåra och akuta tillstånd såsom misstänkt salpingit.

- I dessa fall kan behandlande läkare få remittera för smittspårning och smittskyddsanmälan även om behandling påbörjats.
- Akut behandling enligt detta undantag ges även vid positiv klamydia i samband med abort.
- Behandling ges med Doxycyklin 100 mg, 1 x 2 i 7 dagar.
- Inga kontrollprov behövs om inte gravid, se [Klamydia och LGV – läkarinformation](#).
- Skriv remiss till STI-mott eller UM enligt ovan för smittspårning och Sminet-anmälan: ange den medicinska motiveringen dvs. akutbehandling till att inte avvakta med behandling.

Uppdaterat från föregående version

2026-02-23: Under rubrik Sammanfattning; uppdaterat länk till Hudkliniken vårdriktlinje. Uppdaterat hela stycket under rubrik Handläggning vid positiv klamydiaodling. Bör läsas i sin helhet.