

# Klamydia, provtagning och åtgärder vid positivt prov – KK HS

---

## Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)  
[Handläggning vid positiv klamydiaodling](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Sammanfattning

Chlamydia trachomatis orsakar den sexuellt överförda sjukdom som kallas klamydia, som orsakar cervicit, uretrit och salpingit. För utförlig information se riktlinje för hudkliniken:

[Klamydia](#)

- Klamydiascreening utförs på alla som söker för avbrytande.
- Indicerad provtagning, dvs vid symptom (flytning, oklar feber, nedre buksmärta, blödningsrubbnings eller UVI-symtom med negativ urinsticka och bakterieodling).
- Frikostig provtagning för övrigt.
- Odling från vagina. Provtagningspinnen roteras utmed vaginalväggen 15-30 sekunder. Stoppas därefter i transportröret och bryts av vid skåran.
- Alla klamydiaprover analyseras även för gonorré.

## Handläggning vid positiv klamydiaodling

- Informera patienten om diagnos, behandling och rekommendera avhållsamhet under behandlingen.
- Förskriv T Doxycyklin 100 mg, 1 x 2 i 7 dagar, i enlighet med hudklinikens riktlinje, se länk ovan.
- Skriv remiss i VAS till Hallands sjukhus STD mottagning Halmstad/Varberg för smittspårning, de gör SmiNet-anmälan. På remissen ska det framgå:
  1. om patienten är informerad och om/vilken behandling som getts
  2. var/hur patienten kan nås: aktuellt telefonnummer

### Uppdaterat från föregående version

Januari -23: Reviderad med nytt datum utan ändringar i text.

2021-02-10: Tagit bort stycke om att anmäla till SmiNet, då detta görs av STD-mott.

2020-09-04: Ändrat doseringsregim Doxycyklin.

190822: Ändrat Doxyferm till Doxycyklin med text på receptet.

170616: lagt till förklaring om lab nr vid anmälan.

Ersätter: 2016-02-08

2014-08-06 KK Halmstad författare öl Anna Ackefors + motsvarande i Varberg