

Läkemedelsordination - generella direktiv för gynekologisk mottagning och avdelning – KK Halmstad

Enligt HSLF – FS 2017:37, får läkemedel som ordinerats genom generella direktiv ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsprövning. Dessa direktiv utfärdas restriktivt och omprövas regelbundet. Given dos ska registreras i särskild ordinationshandling och signeras av sjuksköterska. Läkare ska därefter ta ställning till fortsatt eller ändrad medicinering. "Stående ordination" är överordnad "ordination enligt generella direktiv" och läkemedel tillhörande samma grupp får således endast delas ut enligt den förstnämnda ordinationen.

OBS! Det åligger varje enskild sjuksköterska att kontrollera kontraindikationer/interaktioner i FASS (helst www.fass.se)

Förteckning: [Läkemedel - ordination enligt generella direktiv](#) , Hallands sjukhus

Indikation	Preparat	Dosering	Maxdos	Kontraindikation/försiktighet
Postoperativ smärta	Inj OxyNorm 10 mg/ml	0,5 ml s.c eller i.m. Får upprepas efter 4 tim. Dosreduktion 30-60% beroende på ålder och allmäntillstånd.	Se kolumnen dosering 3 ggr	Ges inte till pat med andningsdepression, svår astma, allergi eller gallbesvär.
Preoperativ smärta	Inj Ketogan Novum 5 mg/ml	0,2-0,4 ml ges i.v. Upprepas var 5:e minut tills adekvat smärtlindrad. Maxdos 0,8-1,6 ml. Kan ges 1-1,5 ml s.c. eller i.m. Får upprepas efter 3 tim. Alt. till OxyNorm 1 mg/ml. Dosred. 30-60% beroende på ålder och at.	3 gånger	Andningsfrekvens vakenhetsgrad ska observeras under 30 min. efter senaste inj. Det är inte nödvändigt att vara hos pat. hela tiden. Ges inte till pat. med andningsdepression, svår astma, allergi eller gallbesvär.
Andningspåverkan av opioider. Andn. frekv. <8/min och/el. påtagligt slö eller svårväckt	Naloxon 0,4 mg/ml	0,2 mg = 0,5 ml i.v.	0,4 mg= 1 ml	Kontakta narkosläkare
Smärta	Supp Citodon forte 1g/60 mg eller T. Panocod	1 supp eller 1-2 tabl	Max 4 supp eller 8 tabl per dygn	Astma, gallväggsspasm

Indikation	Preparat	Dosering	Maxdos	Kontraindikation/försiktighet
Smärta vid spontan eller legal abort	T. eller supp. Diklofenak 50 mg	1-2 vid behov	Max 3 per dygn	Känt magsår. Inflammatoriska tarmsjukdomar, ökad blödningstendens. Svår hjärtsjukdom, leversvikt, hepatisk porfyri. Känd överkänslighet mot antiinflammatoriska medel och ASA, astma. Inte preop. utan läkarord.
Smärta vid spontan eller legal abort	T. Ibumetin 400 mg	1-2 vid behov	Max 3 per dygn	Känt magsår. Inflammatoriska tarmsjukdomar, ökad blödningstendens. Svår hjärtsjukdom, leversvikt, hepatisk porfyri. Känd överkänslighet mot antiinflammatoriska medel och ASA, astma. Inte preop. Utan läkarordination.
Smärta i samband med spiralinsättning	Inhal. Niontix (lustgas/syrgas)	30-70% N ₂ O / 70-30% O ₂	70% N ₂ O / 30% O ₂	Vid uttalad sedering eller medvetandepåverkan avbryts inhalationen. Pat andas luft eller v.b. O ₂ tills medvetandet normaliserats
Sömnsvårigheter	T. Zolpidem 5 mg	1-2 tabl till natten	1	Grav leverinsufficiens. Överkänslighet mot zolpidem. Obstruktiv sömnapné
Lugnande muskelavslappande	Supp Stesolid 5 mg alt. T. Oxascand 10 mg	1 supp vid behov alt. 1-2 tabl vid behov	2 ggr. per dag	Sömnapné. Försiktighet vid lever-njurinsufficiens, respiratorisk insufficiens, myastenia gravis, till äldre och vid känt missbruk.
Preoperativ oro	T. Flunitrazepam 0,5 mg	1-2 tabl vid behov	2 st	Sömnapné. Försiktighet vid lever-njurinsufficiens, respiratorisk insufficiens, myastenia gravis, till äldre och vid känt missbruk
Infusion postoperativt	Inf. Rehydrex alt inf. Glukos 50 mg/ml med Na 40 + K20	1000 ml om pat. kräks och har otillräcklig diures.	1000 ml x 1	

Indikation	Preparat	Dosering	Maxdos	Kontraindikation/försiktighet
Hos Rh-neg kvinna efter graviditet inom 72 tim	Inj Rophylac 1500 IE Förfylld spruta	1500 IE i.v. eller i.m.	1 gång	Inte till med abort <v 8+6
Förväntat försvårad spiralinsättning hos pat som remitterats från MVC	T. Cytotec 0,2 mg	2 tabl per oralt 3 timmar innan spiralinsättning	1 gång	Ges inte till ammande kvinnor
Preoperativt inför kirurgiskt abort eller exaeres vid missfall/missad ab	T. Cytotec 0,2 mg	2 tabl per oralt 3 timmar innan spiralinsättning	1 gång	Ges inte till ammande kvinnor

Uppdaterat från föregående version

2023-06-02: Reviderad med nytt datum utan ändringar.

Jan -22: Reviderad med nytt datum utan ändringar.

2019-05-17: tagit bort flertal indikationer då dessa finns i Hallands sjukhus riktlinje.

2018-04-24: ändrat från Oxycodone till Oxynorm, Alvedon 665 till 500 mg max 8 st.

2017: Tillagt om preop inför kir ab eller exaeres vid missfall/missad ab.

Ersätter: 2016-10-10 Tillagt om smärta i samband med spiralinsättning.