

## Läkemedelsordination enligt generella direktiv Mott-op – KK Halmstad

---

### Akuta läkemedel som enligt generella direktiv kan ges av sjuksköterska på Mottagningsoperation – KK Halmstad

Enligt SOSFS: 2001:17(M) får läkemedel som ordinerats genom generella direktiv ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsprövning. Dessa direktiv utfärdas restriktivt och omprövas regelbundet. Given dos ska registreras i särskild ordinationshandling och signeras av sjuksköterska. Läkare ska därefter ta ställning till fortsatt eller ändrad medicinering. "Stående ordination" är överordnad "ordination enligt generella direktiv" och läkemedel tillhörande samma grupp får således endast delas ut enligt den förstnämnda ordinationen. OBS! Det åligger varje enskild sjuksköterska att kontrollera kontraindikationer/interaktioner i FASS (helst [www.fass.se](http://www.fass.se))

Indikation	Preparat	Dosering	Maxdos	Kontraindikation/försiktighet
Smärtstillande	Supp Diklofenak 50 mg	1-2 st	Se kolumnen dosering 100 mg	Känt magsår. Inflammatoriska tarmsjukdomar, ökad blödningstendens. Svår hjärtsjukdom, leversvikt, hepatisk porfyri. Känd överkänslighet mot antiinflammatoriska medel och ASA, astma.
Smärtstillande	Inj Voltaren 25 mg/ml	3 ml = 75 mg i.m.	Se kolumnen dosering 75 mg	Känt magsår. Inflammatoriska tarmsjukdomar, ökad blödningstendens. Svår hjärtsjukdom, leversvikt, hepatisk porfyri. Känd överkänslighet mot antiinflammatoriska medel och ASA, astma.
Smärtstillande	Inj Rapifen 0,5 mg/ml	0,2-0,5 ml i.v	1 mg	Andningsfrekvens och saturation ska observeras

<b>Indikation</b>	<b>Preparat</b>	<b>Dosering</b>	<b>Maxdos</b>	<b>Kontraindikation/försiktighet</b>
Bradycardi Puls<40	Inj Atropin 0,5 mg/ml	1 ml = 0,5 mg i.v.	1 mg	Försiktighet vid hjärtsjukdom. Om upprepad dos behövs kontaktas narkosläkare
Blodtrycksfall	Inj Efedrin 50 mg/ml	0,1 – 0,2 ml = 5 – 10 mg i.v.	20 mg	Observation av puls, blodtryck, och saturation Försiktighet vid hyperthyreos, hjärtsjukdomar och diabetes mellitus. Om upprepad dos behövs kontaktas narkosläkare
Sedering för PCS (patientkontrollerad sedering)	Inj Propofol 10mg/ml	1 ml/min = 20 droppar/min 20 ml sprutpump+Rehydrex 500 ml (inställning 300 ml/tim). 1 tryck =0,5 ml = 5 mg Propofol	300 mg	Andning, saturation och blodtryck ska observeras

### Uppdaterat från föregående version

Ny vårdriktlinje

Författare: Ulla Fagher, överläkare

