

# Preoperativ utredning inför gynekologiska ingrepp – KK Varberg

## Hitta i dokumentet

[Hänvisning till relaterade rutin/vårdriktlinje  
Sammanfattning](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

## Hänvisning till relaterade rutin/vårdriktlinje

Se även regiongemensam rutin: [Läkemedel – Peroral antikoagulantia i samband med operationer - handläggning](#)

Se vårdriktlinje från Anestesi Varberg: [Operationsförberedelser ANE HSV](#).

## Sammanfattning

I samband med operationsanmälan ska patienten fylla i **hälsodeklaration** (gäller 6 månader).

Blodtryck, läkemedel och eventuell allergi dokumenteras i journal vid OP-anmälan eller senast vid inläggning/pre-op besök.

<b>Exeres</b>	Hb. Blodgruppering
<b>Hysteroskopisk operation</b>	Hb. Blodgruppering endast vid myomresektion
<b>Laparoskopi</b>	HB. Blodgruppering. Vid X-misstanke bastest.
<b>Laparotomi samt Robot-operation</b>	Hb. Blodgruppering. Bastest. Vid corpus-ca: även el-status. CT thorax, buk. Vid susp ovarial-ca: även el-status, lever-status, LPK, TPK, APTt, PK, u-sticka, CA-125. CT thorax, buk.
<b>Vaginal hysterektomi</b>	Hb. Blodgruppering. Bastest
<b>TVT</b>	U-nitur och resurin op-dagens morgon
<b>Prolaps</b>	Hb. Blodgruppering. Bastest om vaginal hysterektomi. U-nitur och resurin op-dagens morgon
<b>Mindre ingrepp</b> såsom abrasio, px, loopkonisering, spiralbyten, vulvaingrepp, px, cyst-punktion mm. Hysteroskopisk sterilisering, polyp-extirpation eller diagnostisk.	Ingen provtagning om ej riskgrupper, anamnes på anemi, riklig blödning eller blödningstendens.

**EKG:** alla patienter över 65 år samt alla med

- Hypertoni inklusive diastoliskt tryck över 90 vid inskrivning, hjärt- kärlsjukdom, diabetes
- Sömnapné syndrom
- BMI > 40
- Inom 6 månader före operationen

**Elstatus:** vid hypertoni, hjärtsjukdom, njursjukdom, diuretika. Provtagning inom 6 månader före operationen.

**Bastest:** provtagning inom 5 dagar före operationen.

- Kan tas op-dagens morgon om ej antikroppar vid blodgrupperingen.
- Vid antikroppar beställs minst en dag i förväg korstestat blod 2 enheter inför laparoscopi och hysterektomi.

**Narkosbedömning:** kan ske vid besök eller på dokumentationsunderlag, se Länk till vårdriktlinje [Preop-rutin och smärtlindring vid gynoperation - KKV](#).

**Inför slutenvårdskirurgi** kontrollerar sjuksköterska på gynekologiavdelning att ordinationerna är utförda samt att provsvar och remissvar inkommit.

**Inför dagkirurgi** kontrollerar operationskoordinator att ordinationerna är utförda samt att provsvar och remissvar inkommit.

### Uppdaterat från föregående version

2024-09-20: Reviderad med nytt datum utan ändring efter årlig genomgång.

Nov-19: Reviderad. "endast vid myomresektion" tillagt efter blodgruppering i tabellens högra kolumn, andra rutan.

mars-18: reviderad. Länk till anesthesi-vårdriktlinje tillagd. Hälsodeklaration gäller 6 mån. sista meningen under *Mindre ingrepp* i tabellen, tillagd. Punkter under EKG, tillagd. Punkt och länk om narkosbedömning tillagd. ALAT struket i tabell, 4:e raden. Elstatus ändrat provtagning från 3 v till 6 mån.

Okt-16: reviderad utan ändringar.

150720: lagt till länk till regiongemensam rutin.

Varberg PM gynekologi: **Preoperativ utredning inför gynekologiska ingrepp**, 2013-11-15