

## SVF – livmoderhalscancer, cervixcancer – KKV

---

### Hitta i dokumentet

[Syfte och bakgrund](#)

[Remiss till filterfunktion: gynekolog](#)

[Start av SVF](#)

[Vid mottagningsbesök](#)

[Vid PAD-svar](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Checklista för gynekologimottagning

### Syfte och bakgrund

Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.

Denna rutin är en lokal version av [Region Hallands regionala rutin](#) och gäller för just livmoderhalscancer.

### Remiss till filterfunktion: gynekolog

- Misstänkta symtom: kontaktblödning, postmenopausal blödning eller ihållande vattniga flytningar. Upprepade blödningar under graviditet utan klarlagd orsak. Bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer inkl. hydronefros utan förklaring.
- Skall undersökas av filterfunktion = gynekologisk undersökning och vaginalt ultraljud, cytologprov. Biopsi vid synlig förändring.
- Mål att filterundersökning sker inom 7 dagar.
- Vid remiss från gynekolog med PAD-svar som visar cervixcancer, startas SVF på remiss om inte redan startats, i samråd med läkare i onkologteamet. Dikteras av remissbedömande läkare som även informerar SVF-koordinator.
- Vid konstaterad cervixcancer hos inremitterande kan man i samråd med läkare i onkologteamet direkt på inkommande remiss, även faxes remiss till aktuellt regionsjukhus.

### Start av SVF

#### SVF startas vid välgrundad misstanke - ett eller flera av följande fynd:

- Stark klinisk misstanke om cervixcancer, t.ex. synlig tumör
- Histopatologiskt fynd av cervixcancer

## Vid mottagningsbesök

Vid besök där undersökning och vaginalt ultraljud inger välgrundad misstanke enligt ovan, utförs cytologprov och alltid biopsi. SVF startas.

- Ring överläkare i onkologteamet för avstämning kring undersökningsfynd och planering.
- Remiss för PAD med frågeställning *SVF livmoderhalscancer*. (Mål PAD-besked till patienten inom 9 dagar).
- Dikttera start SVF livmoderhalscancer, akutprioritera diktatet och ange SVF i kommentarrutan.
- Informera patienten om att vi eftersträvar snabb handläggning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF). Dela ut visitkort med telefonnummer till koordinator (finns på varje rum). Informera om att vården oftast kontaktar med dolt nummer.
- Meddela personligen SVF-koordinator Lotti Källman på onkologmottagningen.

## Vid PAD-svar

Vid PAD-svar som inte visar cancer avslutas SVF, anges i diktatet.

Vid PAD-svar som visar cancer kontaktas läkare i onkologteamet för planering av utredning och behandling.

- Läkargesök bokas för PAD-svar, information och kontaktsköterska.
- Vid mikroinvasiv cancer (stadium IA1): remiss patologavdelning på regionklinik för eftergranskning inför ställningstagande till konisering/enkel hysterektomi. Remiss till KK SU avd 67 när eftergranskning är färdig. *Ange datum för start av SVF i remissens anamnesfält.*
- Vid tumör <4 cm: (stadium IA2, IBI, IIA1) remiss MR nedre buk/bäcken (cervixcancerprotokoll) samt CT torax + urografi: *ange i frågeställning SVF livmoderhalscancer*. Remiss faxas till KK regionklinik: *ange datum för start av SVF samt kod VH410, i remissens anamnesfält.*
- Vid tumör >4 cm remiss MR (cervixcancerprotokoll): ange i frågeställningen *SVF livmoderhalscancer*. Remiss faxas till onkologklinik: *ange datum för start av SVF samt kod VH410, i remissens anamnesfält.*
- Akutprioritera diktatet och ange SVF i kommentarrutan.

Informera koordinator fortlöpande om planerad handläggning. Koordinator övervakar planeringen och informerar patienten fortlöpande. Koordinator samråder med medicinsk sekreterare angående kodning.

När SVF startats är målet att operera inom 21 dagar (läkemedel/strålning inom 25 dagar).

### Uppdaterat från föregående version

2019-12-02: Lagt till mening om remiss till KKSU avd 67, under andra punkten "Vid PAD-svar". Ändrat rubriken för bättre sökbarhet, lagt till cervixcancer.

2017-11-14: Flyttat rutinen till vårdriktlinjer.

2017-06: Ny rutin