

# TVT-plastik vid ansträngningsinkontinens

---

## Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)  
[Preoperativt besök hos operatören på Gynekologimottagningen](#)  
[Operationsdagens morgon på op mottagningen](#)  
[Vid op start](#)

[Lokalanestesi](#)  
[Postoperativa kontroller på UVA](#)  
[Hemgång](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Sammanfattning

Gäller vid operation för ansträngningsinkontinens med TVT (LEG10) eller TVT-O (LEG13). Inkontinensplastik under lokalanestesi och lätt sedering.

Dagkirurgi, förmiddagsoperation, max 3 per dag.  
Dokumenteras och följs upp via Gynop-registret.

## Preoperativt besök hos operatören på Gynekologimottagningen

- Preop utredning med miktionslista, resurin, läckagetest och bäckenbottenbedömning.
- Hjärt-/lungstatus och blodtryck.
- Provtagning enligt hälsodeklaration och riktlinje för provtagning.

## Ordinera preop läkemedel

- Antibiotikaprofylax: T Flagyl 400 mg 2 st och T Bactrim Forte 1 st (vid allergi mot sulfas ges i stället Doxyferm 200 mg)
- Preop analgetika: T Alvedon 500 mg, 3 st, T Etoricoxib 120 mg och T OxyContin 5-10 mg (ändras av operatör vid behov, 10 mg OxyContin i NCS)

Ordinationspaket i NCS: § GynOp TVT.

## Operationsdagens morgon på op mottagningen

- U-nitur: avvikande resultat meddelas operatören preoperativt.
- Bladderscan: Residualurin noteras.
- Antibiotikaprofylax och analgetika enligt ordination.
- Patienten är förberedd för tidig op start efter preop besök hos operatören.

## Lokalanestesi

20 ml Carbocain 10 mg/ml + 60 ml NaCl + 2 ml Adrenalin 0,1 mg/ml.

## Postoperativa kontroller på UVA

Ingen KAD, vid ingreppets slut lämnas 100 ml kvar i blåsan.

Patienten försöker kissa 2-3 tim post op: Bladderscan före och efter.

- Om patienten kunnat kissa ett par dl och bladderscan visat resurin <150 ml: ingen ytterligare kontroll.
- Resurin 150-300 ml: Nytt försök att kissa och resurin efter 1-2 tim.
- Resurin 300-600 ml: Tappas. Nytt försök att kissa och ny resurin efter 2-3 tim.
- Resurin >600 ml: Kontakt med operatör för ställningstagande till tappning eller KAD. Patienten kan ev. gå hem med KAD för poliklinisk uppföljning.

## Hemgång

- Sista kontroll av bladderscan (före och efter miktion) före hemgång dokumenteras i VAS.
- Skriftlig info till patienten vid hemgång.
- Sjukskrivning 1-2 veckor.

### Uppdaterat från föregående version

2024-11-05: Reviderad med nytt datum utan ändringar.

2022-04-27: Lagt till ordinationspaket GynOp TVT.

2020-12-29: Under preop analgetika lagt till Alvedon och Etoricoxib.

2020-10-26: Gäller nu för hela KK HS. Ändrat preop analgetika, strukit Alvedon och Arcoxia.

Varberg PM gynekologi: *TVT-plastik vid ansträngningsinkontinens*, 2013-11-15